

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА

Склад:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки листя евкаліпта (*Eucalypti folium*) (1 : 5) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл;

допоміжні речовини: крім екстрагента, відсутні.

Лікарська форма. Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленувато-бурого кольору, зі специфічним запахом. Під час зберігання препарату можливе утворення осаду.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для місцевого застосування у стоматології. Код АТХ А01А D11.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. «Евкаліпта настойка» має у своєму складі дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки, особливо активні щодо грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, що згубно впливають на гриби та найпростіші. Евкаліпт пригнічує ріст золотистого стафілококу, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад, дизентерійної амеби. Основним компонентом ефірної олії є цинеолмоноциклічний терпен. «Евкаліпта настойка» має антисептичну, протизапальну і дезінфікуючу дію, зумовлену окислювальним ефектом цинеолмоноциклічного терпену і протизапальним впливом, пов'язаним практично з усіма фізіологічно активними речовинами, що входять до її складу. Препарат проявляє також помірний седативний (заспокійливий) вплив.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Клінічні характеристики.

Показання.

Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, носоглотки та ротової порожнини (трахеїт,

ларингіт, фарингіт, гінгівіт, стоматит), ушкодження шкіри (у тому числі інфіковані рани), а також легкі форми невротичних розладів (дратівливість, емоційна лабільність, порушення засинання та сну).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Бронхіальна астма, бронхоспазм. Запальні захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчовивідних шляхів. Захворювання печінки з тяжким перебігом.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується приймати протягом тривалого часу.

«Евкалипта настойка» є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки до складу лікарського засобу входить етанол, настойку не рекомендується застосовувати внутрішньо жінкам у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Слід утриматися від керування транспортними засобами або роботи з потенційно небезпечними механізмами на період застосування препарату внутрішньо.

Спосіб застосування та дози.

«Евкалипта настойку» приймати внутрішньо, а також застосовувати для полоскання та парових інгаляцій.

Дорослим рекомендується приймати внутрішньо по 15–30 крапель настойки 3–4 рази на добу після їди; дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3–4 рази на добу після їди.

Для полоскання розвести 10–15 крапель настойки у 200 мл теплої кип'яченої води.

Парові інгаляції проводити за допомогою інгаляторів будь-якого типу, застосовуючи «Евкаліпта настойку» у нерозведеному стані або після попереднього розведення її водою (як для полоскання).

Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого лікувального ефекту і визначається лікарем індивідуально.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються будь-які побічні реакції.

Діти.

Не застосовувати внутрішньо дітям віком до 12 років через вміст етанолу.

Передозування.

Не встановлено.

Побічні реакції.

Реакції з боку імунної системи: при підвищеній чутливості до препарату можуть виникнути алергічні реакції (у тому числі кропив'янка, почервоніння та висипання на шкірі, свербіж, набряк Квінке), іноді – контактний дерматит (у ділянці губ).

З боку органів травлення: нудота, блювання та діарея.

При виражених реакціях застосування препарату слід припинити.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах-крапельницях (без пачки або у пачці).

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/
місцезнаходження заявника.**

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua