

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### СЕПТИЛ ПЛЮС

(SEPTIL PLUS)

#### **Склад:**

*діюча речовина:* етанол;

100 мл розчину містить: не менше 95,1 % і не більше 96,9 % етанолу за об'ємом.

**Лікарська форма.** Розчин.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина.  
Гігроскопічна.

**Фармакотерапевтична група.** Антисептичні та дезінфекційні засоби.

Код АТХ D08A X08.

#### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.

*Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Для дезінфекції шкіри рук.

### ***Протипоказання.***

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри. Дитячий вік до 14 років.

### ***Особливі заходи безпеки.***

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі!

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

### ***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Зовнішньо - наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

*Діти.*

Не застосовувати дітям віком до 14 років.

### ***Передозування.***

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

**Побічні реакції.**

При місцевому застосуванні – подразнення шкіри або слизових оболонок.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

**Термін придатності.**

5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 100 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

За рецептом.

**Виробник.** ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.