

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ШИПШИНІ ПЛОДИ

(ROSAE FRUCTUS)

Склад:

діюча речовина: шипшини плоди (*rosae fructus*);

1 пачка містить шипшини плодів (*rosae fructus*) 100 г або 150 г.

Лікарська форма. Плоди.

Основні фізико-хімічні властивості: цільні, очищені від чашолистиків і плодоніжок несправжні плоди різної форми: від кулеподібної, яйцеподібної або овальної до сильно подовженої веретеноподібної; довжина плодів від 0,7 см до 3 см, діаметр від 0,6 см до 1,7 см. На верхівці плода є невеликий круглий отвір або п'ятикутна площадка. Плоди складаються із м'ясистого, при розриванні соковитого квітколожа (гіпантія) і численних плодиків-горішків, які знаходяться у його порожнині. Стінки висушених плодів тверді, крихкі, зовнішня поверхня блискуча, рідше матова, більш чи менш зморщена. В середині плоди густо вислані довгими, дуже жорсткими щіткоподібними волосками. Горішки дрібні, продовгуваті, зі слабо вираженими гранями.

Колір плодів від оранжево-червоного до бурувато-червоного, горішки світло-жовті, іноді буруваті. Запах відсутній. Смак кислувато-солодкий, злегка в'язучий.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що діють на метаболізм та систему травлення. Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості.

Біологічно активні речовини плодів чинять антисклеротичну, протизапальну дію; активізують ферментні системи та окисно-відновні процеси в організмі, сприяють усуненню дефіциту вітаміну С, нормалізують вуглеводний обмін, посилюють синтез гормонів і регенерацію тканин, підвищують опірність організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищують секрецію жовчі, збільшують діурез, зменшують ламкість і проникність капілярів.

Клінічні характеристики.

Показання.

Загальнозміцнювальний засіб при гострих та хронічних інфекціях, дистрофії, фізичних навантаженнях. Геморагічні діатези; кровотечі різної етіології, передозування антикоагулянтами; гострі та хронічні захворювання печінки (хронічний гепатит, холецистит, холангіт); захворювання нирок і сечового міхура (нефрити, нефропатії у вагітних) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Тромбофлебіт і схильність до нього, недостатність кровообігу, ендокардит, декомпенсований цукровий діабет, тяжкі захворювання нирок, жовчнокам'яна хвороба.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Після застосування відвару рекомендується полоскання ротової порожнини теплою водою або слабким розчином соди для попередження пошкодження зубної емалі.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому препарати шипшини можна застосовувати тільки після консультації лікаря, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній

температурі протягом 45-60 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½ склянки, дітям 10-14 років – по 1/3 склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці, 1-3 роки – по 1 десертній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально, з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Діти.

Препарат застосовують дітям віком від 1 року.

Передозування.

Симптоми: поява або посилення алергічних реакцій.

Лікування: терапія симптоматична.

Побічні реакції.

Можливий розвиток алергічних реакцій (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 100 г або 150 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ШИПОВНИКА ПЛОДЫ

(Rosae fructus)

Состав:

действующее вещество: шиповника плоды (*rosae fructus*);

1 пачка содержит шиповника плодов (*rosae fructus*) 100 г или 150 г.

Лекарственная форма. Плоды.

Основные физико-химические свойства: цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек ложные плоды различной формы: от шарообразной, яйцевидной или овальной до сильно удлинённой веретенообразной; длина плодов от 0,7 см до 3 см, диаметр от 0,6 см до 1,7 см. На верхушке плода есть небольшое круглое отверстие или пятиугольная площадка. Плоды состоят из мясистого, при разрыве сочного цветоложа (гипантия) и многочисленных плодиков-орешков, которые находятся в его полости. Стенки высушенных плодов твердые, хрупкие, наружная поверхность блестящая, реже матовая, более или менее сморщенная. В середине плоды густо высланы длинными, очень жесткими щитовидными волосками. Орешки мелкие, продолговатые, со слабо выраженными гранями.

Цвет плодов от оранжево-красного до буровато-красного, орешки светло-желтые, иногда буроватые. Запах отсутствует. Вкус кисловато-сладкий, слегка вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства, действующие на метаболизм и систему пищеварения. Код АТХ А16А Х.

Фармакологические свойства.

Биологически активные вещества плодов оказывают антисклеротическое, противовоспалительное действие; активизируют ферментные системы и окислительно-восстановительные процессы в организме, способствуют устранению дефицита витамина С, нормализуют углеводный обмен, усиливают синтез гормонов и регенерацию тканей, повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, повышают секрецию желчи, увеличивают диурез, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров.

Клинические характеристики.

Показания.

Общеукрепляющее средство при острых и хронических инфекциях, дистрофии, физических нагрузках. Геморрагические диатезы; кровотечения разной этиологии, передозировки антикоагулянтами; острые и хронические заболевания печени (хронический гепатит, холецистит, холангит); заболевания почек и мочевого пузыря (нефриты, нефропатии у беременных) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Тромбофлебит и склонность к нему, недостаточность кровообращения, эндокардит, декомпенсированный сахарный диабет, тяжелые заболевания почек, желчнокаменная болезнь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Неизвестно.

Особенности применения.

После применения отвара рекомендуется полоскание ротовой полости теплой водой или слабым раствором соды для предупреждения повреждения зубной эмали.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Безопасность и эффективность препаратов в период беременности или кормления грудью не изучались, поэтому препараты шиповника можно применять только после консультации врача, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

1 столовую ложку плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45-60 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2 раза в сутки после еды: взрослым и детям с 14 лет – по $\frac{1}{2}$ стакана, детям 10-14 лет – по $\frac{1}{3}$ стакана, 7-10 лет – по 2 столовые ложки, 3-7 лет – по 1 столовой ложке, 1-3 года – по 1 десертной ложке. Перед применением отвар взболтать.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально, с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

Дети.

Препарат применяют детям с 1 года.

Передозировка.

Симптомы: появление или усиление аллергических реакций.

Лечение: терапия симптоматическая.

Побочные реакции.

Возможно развитие аллергических реакций (в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

Срок годности. 2 года.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Приготовленный отвар хранить при температуре от 8 °С до 15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 100 г или 150 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель.

АО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.