

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

СКИПИДАРНА МАЗЬ

Склад:

діюча речовина: олія терпентинова очищена;

1 г мазі містить олії терпентинової очищеної 0,2 г;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, вода очищена, емульгатор Т-2.

Лікарська форма. Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого кольору з жовтуватим відтінком із запахом скипидару. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТХ М02А Х10.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. «Скипидарна мазь» має відволікаючу, слабку протизапальну, антисептичну та знеболювальну дію. Відволікаюча дія пов'язана зі здатністю проникати через епідерміс і спричиняти рефлекторні зміни внаслідок подразнення рецепторів шкіри. Певну роль відіграє також звільнення зі шкіри біологічно активних речовин, зокрема гістаміну.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Невралгії, міозити, артрити.

Протипоказання.

Тяжкі захворювання нирок і печінки, захворювання шкіри різного генезу, підвищена чутливість до лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

«Скипидарна мазь» хімічно несумісна з розчином йоду.

Особливості застосування.

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі! Якщо мазь випадково потрапила в очі, слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води.

Не наносити на ушкоджені ділянки шкіри.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю застосування препарату протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Слід дотримуватись обережності під час керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, зважаючи на можливість виникнення побічних реакцій генералізованого характеру (див. розділ «Побічні реакції»).

Спосіб застосування та дози.

«Скипидарну мазь» застосовувати дорослим зовнішньо для розтирання болючих ділянок 2-3 рази на день.

Тривалість застосування обумовлена перебігом захворювання.

Необхідно проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або у разі виникнення будь-яких побічних реакцій.

Діти.

Досвід застосування лікарського засобу дітям відсутній, тому мазь не рекомендується для застосування цій категорії пацієнтів.

Передозування.

Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату, посилення побічних явищ.

Побічні реакції.

При підвищеній чутливості до препарату можуть з'явитися алергічні реакції місцевого характеру (включаючи свербіж, набряк, почервоніння шкіри, печіння, висип). В окремих випадках можуть з'явитися алергічні реакції генералізованого характеру (ядуха, прискорене серцебиття, зниження артеріального тиску, запаморочення, судоми, втрата свідомості).

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у тубах в пачках з картону або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/
місцезнаходження заявника.**

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.