

[illegible]

**Діагностика форми.** Таблетки, варієті з піктограм об'єктивним.  
Основні фактори впливають на вибір: продовжує формі двох таблеток системо-  
протинного контролю, варієті піктограм об'єктивним з графіком «2,5» з одного боку.

**Фармакогенетична група.** Засоби, що впливають на цукрову систему з метаболізм.  
Антидіабетичні препарати. Пероральні гіпоглікемічні засоби, що впливають на цукрову систему з метаболізм.  
Класифікація препаратів гіпоглікемічних засобів. Метформін та похідні  
сифонілії. [www.ATA.AIDP.2022](http://www.ATA.AIDP.2022)

национальности. В то же время, в зависимости от этнокультурной ситуации, языки разных народов в разных регионах могут использоваться по-разному. Не исключено, что в некоторых регионах, например, в республике Татарстан, в силу исторически сложившихся традиций, в первую очередь будет использоваться татарский язык. Но это не означает, что татарский язык будет использоваться в ущерб другим языкам, например, русскому. В то же время, в республике Татарстан, в силу исторически сложившихся традиций, в первую очередь будет использоваться татарский язык. Но это не означает, что татарский язык будет использоваться в ущерб другим языкам, например, русскому. В то же время, в республике Татарстан, в силу исторически сложившихся традиций, в первую очередь будет использоваться татарский язык. Но это не означает, что татарский язык будет использоваться в ущерб другим языкам, например, русскому.

Григорьев, Г. В.  
Физико-математический  
институт им. П. А. Чебышева

[illegible]

*Artemisia* spp.  
*Thymus* spp.  
*Artemisia* spp.

[illegible]

Александровский  
Александровский. П  
Александровский (2)

населения (70-90%) и в основном в возрасте 15-40 лет. В настоящее время в мире насчитывается около 100 миллионов больных, а в последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости. В настоящее время в мире насчитывается около 100 миллионов больных, а в последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости.

#### Клінічні характеристики.

**Лікування.**  
Лікування цукрового діабету 2 типу у дорослих, для зменшення ризику серцево-судинної смерті, починають з метформіну і глібенкламіду у випадках зі стабільним і добре контрольованим рівнем глюкози.

Прочитавши книгу,  
- Поняла суть дела

[illegible]



