

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

**ІОВ-МАЛЮК УФК**

**(IOV-MALIUK UFK)**

## **Склад:**

діючі речовини: спиртові гомеопатичні розведення: *Jodum D6*, *Thuja occidentalis D12*, *Berberis, fructus D4*, *Eupatorium perfoliatum D6*;

100 г препарату містять спиртових гомеопатичних розведень: *Jodum D6* – 0,1 мг, *Thuja occidentalis D12* –  $3 \times 10^{-7}$  мг, *Berberis, fructus D4* – 20 мг, *Eupatorium perfoliatum D6* – 0,3 мг;

1 г препарату містить від 41 до 55 гранул;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

**Лікарська форма.** Гранули гомеопатичні.

**Основні фізико-хімічні властивості:** гранули однорідні, правильної кулястої форми, білого з сірим або кремовим відтінком кольору, без запаху, солодкі на смак.

## **Фармакотерапевтична група.**

Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

## **Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Дія препарату зумовлена його активними компонентами. При прийомі гомеопатичної композиції припиняються супутні запальні явища з боку носо- та ротоглотки.

Препарат швидко та майже повністю всмоктується, в основному в порожнині рота і далі в шлунково-кишковому тракті, розподіляється по тканинах і рідинах організму.

Не утворює токсичних метаболітів. Не депонується у тканинах організму.

## **Клінічні характеристики.**

### ***Показання.***

У складі комплексної терапії при аденоїдах, хронічному тонзиліті, респіраторних захворюваннях, частих застудах у дітей.

### ***Протипоказання.***

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Захворювання щитовидної залози.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Значних явищ несумісності з лікарськими препаратами інших груп не виявлено.

### ***Особливості застосування.***

Випадкові короткі перерви і пропуски прийомів не дуже позначаються на загальному процесі лікування.

Інформація для хворих на цукровий діабет: 1 гранула цукрова містить приблизно 0,002 хлібної одиниці.

Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Під час приймання гомеопатичного засобу можливе тимчасове посилення наявних симптомів та симптомів, що спостерігалися раніше. При цьому треба зробити перерву на 5-7 днів та проконсультуватися з лікарем. У період лікування небажані щеплення.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Застосування препарату можливе, якщо очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода і дитини, після консультації лікаря.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Дітям віком від 3 до 7 років слід приймати по 8-10 гранул 1 раз на день за півгодини до їди або

через півгодини після їди. Препарат розсмоктують і не запивають. Приймають 5 днів, потім 2 дні перерви.

Курс лікування не менше 2 місяців. Можливі повторні курси після консультації з лікарем.

*Діти.*

Лікарський засіб застосовують дітям від 3 до 7 років.

### ***Передозування.***

Відомостей щодо випадків передозування немає.

### ***Побічні реакції.***

Можливі алергічні реакції.

### ***Термін придатності.***

3 роки.

*Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

### ***Умови зберігання.***

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці.

### ***Упаковка.***

По 20 г у флаконах. 1 флакон у пачці з картону.

### ***Категорія відпуску.***

Без рецепта.

### ***Виробник.***

ПрАТ «Біолік».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.

**Заявник.**

ТОВ «Українська фармацевтична компанія».

**Місцезнаходження заявника.**

Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1 У.