

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ІНФЛЮЦИД (INFLUCID®)

Склад:

діючі речовини: Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3, Phosphorus D5, Bryonia D2, Eupatorium perfoliatum D1;

1 таблетка містить Aconitum D3 25 мг, Gelsemium D3 25 мг, Ipecacuanha D3 25 мг, Phosphorus D5 25 мг, Bryonia D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum D1 25 мг;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль пшеничний.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: білі або майже білі, іноді з окремими темними крапками, плоскі таблетки зі скошеною кромкою та рискою для розділення.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Препарат містить шість активних компонентів, найбільш прийнятних для лікування гострих застудних захворювань верхніх дихальних шляхів і грипу. Засіб швидко зупиняє типові ознаки гострої інфекції дихальних шляхів, такі як гарячка, головний біль, болючість м'язів, а також риніт, фарингіт. Препарат посилює природний захист організму і сприяє швидкому видужанню і відновленню сил після перенесеного захворювання, у такий спосіб зменшує ознаки виснаження (астенічний синдром) або запобігає їм. Застосування препарату при перших проявах захворювання або відразу після контакту з людьми, які захворіли, сприяє запобіганню розвитку захворювання.

Клінічні характеристики.

Показання.

Профілактика і лікування грипоподібних інфекцій, що супроводжуються лихоманкою, та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, підтримуюче лікування грипу.

Протипоказання. Гіперчутливість до будь-якого з активних компонентів лікарського засобу, наприклад до *Eupatorium perfoliatum* чи до інших видів родини *Asteraceae*, або до будь-якої з допоміжних речовин.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не встановлена.

Пацієнтам слід проконсультуватися з лікарем, якщо вони приймають або приймали нещодавно будь-які інші лікарські засоби, зокрема безрецептурні.

Дія гомеопатичних лікарських засобів може відрізнятися залежно від факторів, пов'язаних із наявністю в пацієнта шкідливих звичок, таких як куріння та вживання алкоголю.

Застосування цього гомеопатичного лікарського засобу не виключає одночасного застосування інших лікарських засобів.

Особливості застосування.

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Якщо лихоманка триває понад 3 доби або температура тіла вище 39 °C, або якщо виникають будь-які додаткові незрозумілі чи постійні симптоми, або якщо немає покращення стану, або відбувається погіршення, необхідно проконсультуватися з лікарем, тому що це можуть бути захворювання, які потребують медичного обстеження.

Застереження для хворих із глютенною хворобою: Інфлюцид містить пшеничний крохмаль. Пшеничний крохмаль може містити глютен, але лише в незначній кількості, і тому вважається безпечним для людей з целіакією. Пацієнтам з алергією на пшеницю (відмінною від целіакії) не слід застосовувати цей лікарський засіб.

Інфлюцид містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні застосовувати препарат.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інфлюцид у період вагітності або годування груддю можна застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Дітям віком від 12 років і дорослим *при гострому захворюванні* приймати по 1 таблетці кожні 2 години (не більше 6 таблеток на добу) до настання покращення, далі — по 1-3 таблетки на добу.

Тривалість лікування — 7-10 днів (до повного зникнення симптомів).

Для профілактики респіраторно-вірусної інфекції приймати по 1 таблетці 3 рази на добу.

Діти віком від 1 до 2 років: $\frac{1}{2}$ таблетки 2 рази на добу. Максимальна добова доза — 1 таблетка.

Діти віком від 2 до 3 років: $\frac{1}{2}$ таблетки 3 рази на добу. Максимальна добова доза — 1,5 таблетки.

Діти віком від 3 до 5 років: $\frac{1}{2}$ таблетки кожні 4 години. Максимальна добова доза — 2 таблетки.

Діти віком від 5 до 6 років: $\frac{1}{2}$ таблетки кожні 3 години. Максимальна добова доза — 2,5 таблетки.

Діти віком від 6 до 12 років: $\frac{1}{2}$ таблетки кожні 2 години. Максимальна добова доза — 3 таблетки.

Для профілактики респіраторно-вірусної інфекції дітям віком від 6 до 12 років приймати по 1 таблетці 2 рази на добу. Інфлюцид не слід застосовувати для профілактики інфекцій у дітей віком до 6 років.

Тривалість застосування після контакту з хворими на респіраторну інфекцію або грип – 1 тиждень.

Таблетки приймати за пів години до їди або через пів години після їди, даючи їм повільно розчинитися в роті. Для маленьких дітей рекомендується розчиняти таблетку у невеликій кількості води (наприклад у чайній ложці води).

Діти. Препарат призначають дітям віком від 1 року.

Передозування.

У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

Побічні реакції.

У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі, шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту, блювання або діарею.

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має велике значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їхнім законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 20 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany