

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

НИРКОВИЙ ЧАЙ

(ORTHOSIPHONIS STAMINEI FOLIA)

### **Склад:**

діюча речовина: ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*);

1 пачка містить: ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) 50 г;

1 фільтр-пакет містить: ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) 1,5 г.

**Лікарська форма.** Листя.

**Основні фізико-хімічні властивості:** шматочки листя і стебел різної форми зеленого, сірувато-зеленого, зеленувато-коричневого, фіолетово-бурого або фіолетово-коричневого кольору з краплинками жовтувато-білого кольору.

**Фармакотерапевтична група.** Рослинні засоби з діуретичним ефектом. Код АТХ С03В Х.

### **Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Біологічно активні речовини листя чинять діуретичну, спазмолітичну і жовчогінну дію; підвищують секрецію шлункового соку, збільшують у ньому вміст вільної соляної кислоти, виводять з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

Гострі та хронічні захворювання нирок, холециститу; набряки, спричинені порушеною функцією нирок або серцевою недостатністю (у складі комплексної терапії).

#### **Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату; гіперацидний гастрит, виразкова

хвороба.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

**Особливості застосування.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** За призначенням лікаря, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

1 десертну ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20-30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по  $\frac{1}{2}$  склянки; дітям віком 12-14 років – по  $\frac{1}{3}$  склянки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці. При холециститах застосовувати після їди. Перед прийомом настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20-30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по  $\frac{1}{2}$  склянки, дітям віком 12-14 років – по  $\frac{1}{3}$  склянки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці. При холециститах застосовувати після їди.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

**Діти.** Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

**Передозування.** При передозуванні можливий біль у ділянці нирок, печінки, шлунка.

**Побічні реакції.**

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 4 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.