

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ВАГІКАЛЬ

Склад:

діюча речовина: *Calendula officinalis*;

1 супозиторій містить *Calendula officinalis* Ø 150 мг;

допоміжні речовини: макрогол 400, макрогол 1500, макрогол 4000.

Лікарська форма. Супозиторії вагінальні.

Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії циліндрично-конічної форми білого кольору з жовтуватим відтінком. На зрізі допускається наявність повітряного та пористого стрижня та лійкоподібного заглиблення.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються у гінекології. Код АТХ G02C C.

Фармакологічні властивості.

Calendula officinalis (календула лікарська) містить флавоноїди, сапоніни, каротиноїди, тритерпенові спирти. Їх фармакологічна дія взаємно доповнюється і забезпечує протизапальний ефект, пришвидшує процес грануляції та епітелізації, діє фунгістатично і цитотоксично, а також чинить захисну, антибіотичну та імуностимулювальну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Запальні захворювання піхви, які супроводжуються виділеннями, свербіжем, печінням, почервонінням.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Підвищена чутливість до рослин родини *Asteraceae* (складноцвітих), таких як ромашка, ехінацея, арніка (можлива перехресна реакція).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не вивчалася.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає достатніх даних щодо застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Супозиторії застосовують інтравагінально 2-3 рази на добу. Перед застосуванням супозиторій слід зволожити прокип'яченою охолодженою водою.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. Якщо протягом 3-4 днів від початку лікування симптоми не зникають або відмічається погіршення стану, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Діти.

Не застосовують.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Лікарський засіб, як правило, переноситься добре, проте при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій.

При застосуванні препарату можливі подразнення слизової оболонки піхви і статевих губ.

У разі виникнення будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

ФАРМІНА Лтд.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Вул. Ліпска, 44, 30-721 Краків, Польща.