

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

**Куріозин**

**(Curiosin)**

### **Склад:**

*діюча речовина:* цинку гіалуронат;

1 г гелю містить цинку гіалуронату 1,027 мг;

*допоміжні речовини:* калію сорбат, натрію гідроксид, карбомер, вода очищена.

**Лікарська форма.** Гель.

*Основні фізико-хімічні властивості:* безбарвний або майже безбарвний прозорий гель, практично без запаху.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати для місцевого лікування акне.

Код АТХ D10 АХ.

### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Гіалуронова кислота та інші молекули протеогліканів стабілізують міжклітинну речовину сполучної тканини. Іони цинку блокують активність ліпази *P. acne*, а також мають антибактеріальну властивість. Гель Куріозин знижує утворення вугрів і вираженість запального процесу. Локальне нанесення гелю Куріозин доповнює підвищену потребу в гіалуроновій кислоті у тканинах.

Гіалуронова кислота з молекулами води утворює дисперсійний матрикс, який заміщує дефект тканини, утворює натуральну опору для клітин, підвищує активність гранулоцитів і макрофагів та підсилює проліферацію фібробластів і ангиогенез. Гіалуронат цинку порівняно з гіалуронатом натрію має бактеріостатичну дію на ряд мікроорганізмів.

*Фармакокінетика.*

Щодо фармакокінетики екзогенної гіалуронової кислоти даних недостатньо.

За даними наукової літератури, концентрація гіалуронової кислоти у здорових добровольців знаходиться в межах 10–100 мкг/л. Підвищений рівень гіалуронової кислоти в плазмі крові виявлено у здорових (досліджуваних) пацієнтів літнього віку, вранці при наявності порушеної функції печінки. Гіалуронова кислота швидко видаляється з плазми крові, розщеплення на компоненти з малою молекулярною масою відбувається в печінці. Після внутрішньовенного введення період напіввиведення ( $t_{1/2}$ ) становить 2,5–5,5 хвилини. Гіалуронова кислота майже не виділяється з сечею (1 %). За оцінкою даних щодо 22 здорових добровольців, кліренс гіалуронової кислоти становить 320 мкг за 24 години.

### **Клінічні характеристики.**

**Показання.** Місцеве лікування усіх форм вугрів легкого і середнього ступенів тяжкості, у тому числі комедонів і папульозно-пустульозних вугрів.

### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до будь-якого інгредієнта лікарського засобу.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Дотепер невідома.

### **Особливості застосування.**

Препарат не спричиняє фоточутливість, не фарбує шкіру або білизну.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Немає даних про застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами.

### **Спосіб застосування та дози.**

Препарат призначений для зовнішнього застосування.

2 рази на добу слід нанести тонким шаром на уражену ділянку після гігієнічного очищення шкіри.

Препарат через кілька хвилин всмоктується, тому немає необхідності у накладенні пов'язки.

*Діти.*

Немає даних про застосування препарату дітям віком до 14 років. Спосіб застосування лікарського засобу Куріозин, гелю, для дітей віком від 14 років такий же, як і для дорослих.

### ***Передозування.***

Дотепер невідомо.

### ***Побічні реакції.***

На початку курсу терапії може з'являтися відчуття печіння і почервоніння шкіри – явища, які в ході терапії поступово зникають. При сухій шкірі може виникати відчуття натягу і розтягування шкіри.

Можливий розвиток алергічних реакцій в осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

З боку шкіри і підшкірної тканини.

Часто ( $\geq 1/100$ – $< 1/10$ ): відчуття печіння шкіри.

***Термін придатності.*** 2 роки.

***Умови зберігання.*** Зберігати при температурі не вище 30 °С.

Препарат зберігати в недоступному для дітей місці.

***Упаковка.*** 15 г гелю у закритій алюмінієвій тубі, з білим поліетиленовим ковпачком, що має перфоруючий наконечник. Одна туба в картонній упаковці.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.*** ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Н-1103, Будапешт, вул. Демреї, 19-21, Угорщина.