

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**  
**БІОСЕПТ 70**

**Склад:**

діюча речовина: етанол;

не менше 69,3 % об/об і не більше 70,7 % об/об етанолу та воду.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфекційну, місцево-подразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.

*Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Хірургічна обробка рук хірургів.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість. Гострі запальні процеси шкіри.

***Особливі заходи безпеки.***

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі!

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Результати взаємодії при зовнішньому застосуванні етанолу з іншими лікарськими засобами невідомі.

***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Зовнішньо – для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук.

Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1 : 1.

*Діти.*

Застосовують за призначенням лікаря.

***Передозування.***

Випадки передозування при зовнішньому застосуванні невідомі.

***Побічні реакції.***

При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ, необхідно звернутися до лікаря.*

***Термін придатності.***

5 років.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

***Умови зберігання.***

При температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці. Не допускати контакту з відкритим вогнем.

***Упаковка.***

По 100 мл у флаконах або банках скляних.

По 100 мл у флаконах полімерних.

По 1 л у каністрах полімерних (для постачання у медичні заклади).

***Категорія відпуску.***

За рецептом.

***Виробник.***

ПрАТ «Біолік».

***Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.***

Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.

**Виробник.**

ПП «Кілафф».

**Місцезнаходження.**

Україна, 40035, Сумська обл., місто Суми, вулиця Харківська, будинок 6.

**Заявник.**

ТОВ «ЗНАК ЯКОСТІ ЛЮКС».

**Місцезнаходження заявника.**

Україна, 34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Белгородська, буд. 27.