

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

БУЗИНИ ЧОРНОЇ КВІТКИ

(SAMBUCI NIGRAE FLORES)

Склад:

діюча речовина: бузини чорної квітки (*Sambuci nigrae flores*);

1 пачка містить бузини чорної квіток (*Sambuci nigrae flores*) 40 г;

1 пачка містить бузини чорної квіток (*Sambuci nigrae flores*) 50 г;

1 фільтр-пакет містить бузини чорної квіток (*Sambuci nigrae flores*) 1,5 г.

Лікарська форма. Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: цільна сировина: окремі квітки і бутони на коротких голих квітконіжках або без них з домішкою гілочок, суцвіть і листя. Колір жовтуватий;

порошок крупний: суміш подрібнених шматочків квіток і бутонів з домішкою квітконіжок, гілочок і листя різної форми. Колір жовтуватий з буруватими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТХ R05X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять потогінну, протизапальну, знеболювальну, сечогінну та м'яку відхаркувальну дію.

Клінічні характеристики.

Показання. Грип, запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти, ларингіти), нирок і сечового міхура – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози. 1,5 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим та дітям від 16 років приймати у теплому вигляді по ½ склянки 2 рази на добу або по 2 столові ложки 5-6 разів на добу після їди. Дітям віком 3-7 років – по 1 столовій ложці 2 рази на добу після їди; 7-12 років – по 2 столові ложки 2 рази на добу після їди; 12-16 років – по ½ склянки 2 рази на добу після їди. Перед прийомом настій збовтати.

1 фільтр-пакет помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл (½ склянки) окропу, закрити і настоювати 15 хв. Дорослим та дітям віком від 16 років приймати у теплому вигляді по ½ склянки 3 рази на добу після їди. Дітям віком 3-7 років – по 2 десертні ложки 3 рази на добу після їди; 7-12 років – по 2 столові ложки 3 рази на добу після їди; 12-16 років – по ½ склянки 3 рази на добу після їди.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні реакції. Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При виникненні побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 40 г або 50 г у пачках з внутрішнім пакетом,
по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.