

# ІНСТРУКЦІЯ

## ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

### СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА

(Unguentum sulfuratum simplex)

#### **Склад:**

діюча речовина: сірка;

1 г мазі містить 0,33 г сірки;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, вода очищена, емульгатор Т2.

**Лікарська форма.** Мазь 33,3 %.

**Основні фізико-хімічні властивості:** мазь жовтуватого кольору.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Дерматологічні засоби. Місцеві протипаразитарні, протимікробні засоби. Препарати, що містять сірку. Код АТХ D10A B02.

#### **Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Сірчана мазь проста має протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, які чинять антисептичну дію.

**Фармакокінетика.**

При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та парафін білий м'який, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

#### **Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Захворювання шкіри – себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі комбінованої терапії).

***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до препарату.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з окиснювачами (пероксидом водню, калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку.

***Особливості застосування.***

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно мити.

***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Безпеку та клінічну ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчали, тому застосовувати мазь у цей період можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами не описаний.

***Спосіб застосування та дози.***

Сірчану мазь просту застосовувати зовнішньо. Мазь наносити на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу. При лікуванні корости схема застосування препарату та вимоги щодо дотримання правил особистої гігієни визначає індивідуально лікар.

***Діти.***

Протипоказано дітям віком до 3 років. Дітям віком від 3 до 12 років застосовувати препарат тільки за рекомендацією лікаря з урахуванням співвідношення користь/ризик.

***Передозування.***

Не спостерігалось.

***Побічні реакції.***

Алергічні реакції.

***Термін придатності.*** 2 роки.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 25 г або по 50 г у контейнерах. По 20 г або по 40 г у тубах алюмінієвих. По 20 г або по 25 г, або по 40 г у тубах ламінатних. По 1 тубі в пачці або без пачки.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

***Заявник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

**Місцезнаходження заявника.**

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.