

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ІНГАЛІПТ

#### **Склад:**

*діючі речовини:* 1 балон (30 мл) містить стрептоциду розчинного 0,75 г; сульфатіазолу натрію гексагідрату 0,75 г; тимолу 0,015 г; олії евкаліптової 0,015 г; олії м'яти перцевої 0,015 г;

*допоміжні речовини:* етанол 96 %, цукор, гліцерин, полісорбат 80, вода очищена, азот – тиск до 0,6 МПа.

**Лікарська форма.** Аерозоль.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору, з характерним запахом тимолу та ментолу.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що діють на респіраторну систему. Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

#### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Інгаліпт – комбінований препарат, який чинить протизапальну, протимікробну, охолоджувальну та відволікаючу дію. Активний відносно грамположитивних і грамнегативних мікроорганізмів.

*Фармакокінетика.*

Не вивчалась.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Інфекційно-запальні захворювання ЛОР-органів і слизової оболонки порожнини рота: тонзиліт, фарингіт, ларингіт, афтозний і виразковий стоматити.

### ***Протипоказання.***

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При одночасному застосуванні Інгаліпту з препаратами, що є похідними п-амінобензойної кислоти (новокаїн, анестезин, дикаїн), відбувається інактивація антибактеріальної активності сульфаніламідів.

### ***Особливості застосування.***

Перед застосуванням препарату рекомендується прополоскати порожнину рота теплою кип'яченою водою. З уражених ділянок порожнини рота (виразки, ерозії) за допомогою стерильних тампонів видалити некротичний наліт.

Після зрошування порожнини рота препаратом слід утримуватися від прийому їжі впродовж 15-30 хвилин.

Перед застосуванням препарату особам, схильним до алергії та хворим на цукровий діабет (оскільки препарат містить цукор), необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем.

Перед застосуванням необхідно зняти захисний ковпачок з балона і на шток клапана надіти розпилювач, що є в комплекті. Потім вільний край розпилювача ввести у порожнину рота і натискати на голівку клапана протягом 1-2 секунд, утримуючи балон вертикально. З метою запобігання закупорки розпилювача після закінчення маніпуляції його необхідно продмухати або помістити у склянку з чистою водою. Закрити балон захисним ковпачком, щоб запобігти його забрудненню.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе під контролем лікаря, зваживши співвідношення користь/ризик, суворо дотримуючись режиму дозування препарату.

### ***Здатність впливати на швидкість реакцій при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.***

Водіям автотранспорту та операторам механізмів необхідно застосовувати препарат з обережністю у зв'язку з тим, що препарат містить спирт етиловий. Препарат може спотворювати результати дослідження на алкоголь.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Застосовувати дорослим і дітям віком від 3 років місцево, шляхом зрошення слизових оболонок порожнини рота і носоглотки.

Перед застосуванням препарату на аерозольний балон необхідно надіти розпилювач, декілька разів струснути балон, після чого шляхом натискання розпилювача до упору рівномірно зрошувати препаратом уражену ділянку.

За один сеанс інгаляції здійснювати 2-3 розпилення, утримуючи препарат у порожнині рота 5-7 хвилин. Зрошення проводити 3-4 рази на добу. Тривалість застосування препарату залежить від інтенсивності терапії і зазвичай становить 7-10 днів.

### ***Діти.***

Препарат не застосовувати дітям віком до 3 років.

У дітей можливе виникнення рефлексорного бронхоспазму у зв'язку з наявністю у складі препарату евкаліптової олії та олії м'яты перцевої. Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря. Застосовувати препарат дітям віком від 3 років, враховуючи можливість розвитку рефлексорного бронхоспазму.

### ***Передозування.***

У випадку передозування можливе посилення побічних ефектів препарату.

При всіх випадках передозування необхідно відмінити застосування препарату, прополоскати порожнину рота теплою кип'яченою водою.

Лікування – симптоматичне.

### ***Побічні реакції.***

*З боку імунної системи:* алергічні реакції, включаючи свербіж, кропив'янку, висипання на шкірі, набряк у місці контакту, в осіб із підвищеною чутливістю можливий розвиток ангіоневротичного набряку (набряк Квінке).

*З боку дихальної системи:* утруднення дихання; можливе виникнення рефлексорного бронхоспазму, зумовленого вмістом ефірних олій.

*З боку шлунково-кишкового тракту:* нудота, блювання.

*Місцеві ефекти:* відчуття печіння у роті або першіння, або клубка у горлі, гіперемія слизової оболонки зіву.

*Інше:* загальна слабкість.

У разі виявлення будь-яких небажаних явищ або незвичних реакцій слід порадитися з лікарем щодо подальшого застосування препарату.

**Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.

**Упаковка.**

По 30 мл у балоні аерозольному алюмінієвому; по 1 балону з розпилювачем в пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** АТ «Стома», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна,

61105, м. Харків, вул. Ньютона, 3.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по медицинскому применению лекарственного средства**

### **ИНГАЛИПТ**

#### ***Состав:***

*действующие вещества:* 1 баллон (30 мл) содержит стрептоцида растворимого 0,75 г; сульфатаиозола натрия гексагидрата 0,75 г; тимола 0,015 г; масла эвкалиптового 0,015 г; масла мяты перечной 0,015 г;

*вспомогательные вещества:* этанол 96 %, сахар, глицерин, полисорбат 80, вода очищенная, азот – давление до 0,6 МПа.

**Лекарственная форма.** Аэрозоль.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, с характерным запахом тимола и ментола.

#### **Фармакотерапевтическая группа.**

Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

#### **Фармакологические свойства.**

*Фармакодинамика.*

Ингалипт – комбинированный препарат, который оказывает противовоспалительное, противомикробное, охлаждающее и отвлекающее действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

*Фармакокинетика.*

Не изучалась.

## **Клинические характеристики.**

### ***Показания.***

Инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта: тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматиты.

### ***Противопоказания.***

Повышенная индивидуальная чувствительность к любым компонентам препарата.

### ***Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.***

При одновременном применении Ингалипта с препаратами, являющимися производными п-аминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин), происходит инактивация антибактериальной активности сульфаниламидов.

### ***Особенности применения.***

Перед применением препарата рекомендуется прополоскать полость рта теплой кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью стерильных тампонов удалить некротический налет.

После орошения полости рта препаратом следует удерживаться от приема пищи в течение 15-30 минут.

Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии и больным сахарным диабетом (поскольку препарат содержит сахар), необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Перед применением необходимо снять защитный колпачок с баллона и на шток клапана надеть распылитель, имеющийся в комплекте. Затем свободный край распылителя ввести в полость рта и нажимать на головку клапана в течение 1-2 секунд, удерживая баллон вертикально. С целью избежания закупорки распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой. Закрывать баллон защитным колпачком во избежание его загрязнения.

### ***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно под контролем врача, взвесив соотношение польза/риск, строго соблюдая режим дозирования препарата.

***Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.***

Водителям автотранспорта и операторам механизмов необходимо применять препарат с осторожностью в связи с тем, что препарат содержит спирт этиловый. Препарат может исказить результаты исследования на алкоголь.

***Способ применения и дозы.***

Применять взрослым и детям с 3 лет местно, путем орошения слизистых оболочек полости рта и носоглотки.

Перед применением препарата на аэрозольный баллон необходимо надеть распылитель, несколько раз встряхнуть баллон, после чего путем нажатия распылителя до упора равномерно орошать препаратом пораженный участок.

За один сеанс ингаляции осуществлять 2-3 распыления, удерживая препарат в полости рта 5-7 минут. Орошения проводить 3-4 раза в сутки. Продолжительность применения препарата зависит от интенсивности терапии и обычно составляет 7-10 суток.

***Дети.***

Препарат не применять детям до 3 лет.

У детей возможно возникновение рефлекторного бронхоспазма в связи с наличием в составе препарата эвкалиптового масла и масла мяты перечной. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача. Применять препарат детям с 3 лет, учитывая возможность развития рефлекторного бронхоспазма.

***Передозировка.***

В случае передозировки возможно усиление побочных эффектов препарата.

При всех случаях передозировки необходимо отменить применение препарата, прополоскать полость рта теплой кипяченой водой.

Лечение - симптоматическое.

***Побочные реакции.***

*Со стороны иммунной системы:* аллергические реакции, включая зуд, крапивницу, высыпания на коже, отек в месте контакта, у лиц с повышенной чувствительностью возможно развитие ангионевротического отека (отек Квинке).

*Со стороны дыхательной системы:* затруднение дыхания; возможно возникновение рефлекторного бронхоспазма, обусловленного содержанием эфирных масел.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* тошнота, рвота.

*Местные эффекты:* ощущение жжения во рту или першения, или комка в горле, гиперемия слизистой оболочки зева.

*Другое:* общая слабость.

*В случае выявления каких-либо нежелательных явлений или необычных реакций следует проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.*

**Срок годности.** 2 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.**

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

**Упаковка.**

По 30 мл в баллоне аэрозольном алюминиевом; по 1 баллону с распылителем в пачке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Производитель.** АО «Стома», Украина.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.**  
Украина, 61105, г. Харьков, ул. Ньютона, 3.