# ІНСТРУКЦІЯ

**для медичного застосування лікарського засобу**

**ВІНІЛІН®**

**(Бальзам Шостаковського)**

## *Склад:*

*діюча речовина:* ефір полівінілбутиловий.

1 г Вініліну® (Бальзаму Шостаковського) містить 1 г ефіру полівінілбутилового.

**Лікарська форма.** Рідина нашкірна.

*Основні фізико-хімічні властивості:* густа, в'язка рідина від світло-жовтого до коричнево-жовтого кольору зі специфічним запахом. На повітрі не густіє і не висихає. Легко розчиняється у пропанолі і толуолі, практично не розчиняється у воді і спирті етиловому 96 %. Змішується у всіх співвідношеннях з етиловим ефіром, хлороформом, оліями і рідким парафіном.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби для лікування ран та виразкових уражень.

Код АТХ D03A X.

***Фармакологічні властивості.***

*Фармакодинаміка.*

Вінілін® (Бальзам Шостаковського) має протимікробну дію, сприяє очищенню ран, регенерації та епітелізації тканин.

*Фармакокінетика.*

Антисептична дія зумовлена здатністю препарату дегідратувати мікробні клітини, викликаючи коагуляцію білка і загибель мікробних клітин. У результаті відновлення відбувається заміщення вогнищ некрозу специфічною та/або сполучною (має найвищий потенціал регенерації) тканиною.

## Клінічні характеристики.

### *Показання.*

При фурункулах, карбункулах, трофічних виразках, гнійних ранах, пораненнях м’яких тканин, опіках, обмороженнях, дерматитах та запальних захворюваннях шкіри.

### *Протипоказання.*

Індивідуальна підвищена чутливість організму до лікарського засобу.

### *Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.*

Не описана.

### *Особливості застосування.*

Можна застосовувати у вигляді 20 % олійного розчину, у тому числі у поєднанні з іншими сумісними з Вініліном® лікарськими засобами (мазями на вазеліновій та інших основах, пастами та кремами).

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Інформація щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня, застосування препарату не рекомендується.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Відсутні дані про негативний вплив лікарського засобу на здатність керувати автотранспортом і обслуговувати рухомі механічні пристрої.

### *Спосіб застосування та дози.*

Застосовують для змочування серветок і безпосереднього нанесення на уражену поверхню, в чистому вигляді або у вигляді 20 % розчину на персиковій чи інших рослинних оліях, а також у мазях. Частота застосування – 3–5 раз на добу.

Курс лікування визначається лікарем індивідуально.

*Діти.*

Інформація щодо застосування препарату дітям відсутня, застосування препарату не рекомендується.

***Передозування.***

Симптоми передозування не описані.

***Побічні реакції.***

Дуже рідко - індивідуальна підвищена чутливість до препарату: можливі алергічні реакції, в основному місцевого характеру.

***Термін придатності.*** 5 років.

**Умови зберігання.**

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 50 г у банках або по 100 г у банках або флаконах.

По 50 г у банках або по 100 г у банках або флаконах, по 1 флакону або банці у пачку.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

## Виробник.

АТ «ВІТАМІНИ».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31.