

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

**ФЛАДЕКС**

**(FLADEX)**

## **Склад:**

*діюча речовина:* фладексан;

1 г мазі містить фладексану у перерахуванні на вміст суми флавоноїдів 30 % 20 мг;

*допоміжні речовини:* парафін білий м'який, пропіленгліколь, кислота стеаринова, емульгатор № 1, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), вода очищена.

**Лікарська форма.** Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* мазь від світло-коричневого до темно-коричневого кольору, зі специфічним запахом.

**Фармакотерапевтична група.** Дерматологічні засоби. Код АТХ D11А Х.

## **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Лікарський засіб рослинного походження, містить фладексан - екстракт трави десмодіуму канадського родини бобових.

Препарат проявляє місцеву протизапальну, знеболювальну та протисвербіжну дію, має антиалергічні та десенсибілізуючі властивості, проявляє протівірусну активність відносно вірусів лишаю пухирчастого (герпесу звичайного) і оперізувального - *Herpes simplex* і *Herpes zoster*, а також стимулює репаративні процеси у шкірі.

*Фармакокінетика.* При нанесенні на шкіру компоненти мазі не виявляються у сироватці крові.

## **Клінічні характеристики.**

**Показання.** Для місцевого лікування усіх форм і стадій псоріазу, алергічного, атопічного (особливо у підгострий період і у період згасання процесу), періорального та себорейного дерматитів, нейродерміту, фотодерматозів, токсидермій, а також лишаю пухирчастого (герпесу) різної локалізації (губної, щічної, носової, вушної, генітальної) та оперізувального

лишаю.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Дані відсутні.

**Особливості застосування.** У зв'язку з наявністю у складі метилпарабену (Е 218) і пропілпарабену (Е 216), препарат може спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені).

Пропіленгліколь може спричинити подразнення шкіри.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Лікування препаратом не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

**Спосіб застосування та дози.** Застосовувати дорослим і дітям зовнішньо, місцево.

**Дерматити різного походження, пухирчастий (герпес) і оперізувальний лишай.** Мазь наносити тонким шаром, злегка втираючи, на уражену ділянку шкіри 2-4 рази на добу, бажано з моменту появи перших ознак захворювання. Тривалість курсу лікування - 5-14 днів.

**Псоріаз.** Мазь наносити на уражену ділянку шкіри під восковий папір 1-2 рази на добу. Курс лікування - 10-30 днів і більше, особливо у разі великобляшкових форм.

Залежно від результатів терапії та у випадках рецидивів курс лікування препаратом можна повторювати 2-3 і більше разів.

**Діти.** Лікарський засіб можна застосовувати дітям.

-

**Передозування.** Випадки передозування не описані.

**Побічні реакції.** У деяких випадках можлива поява печіння, яке зникає після

тимчасового припинення застосування препарату.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °С до 8 °С.  
Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 10 г або 15 г у тубі в коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.** Україна,  
61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.