

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### АНТИТРОМБ

#### **Склад:**

*діюча речовина:* емоксипін;

1 г мазі містить емоксипіну 10 мг;

*допоміжні речовини:* олія рицинова, пропіленгліколь, емульгатор № 1, бронітрол, вода очищена;

*допоміжні речовини, що входять до складу емульгатора № 1:* спирт цетиловий, спирт стеариловий.

**Лікарська форма.** Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* мазь білого кольору, однорідної консистенції, зі слабким специфічним запахом.

**Фармакотерапевтична група.**

Капіляротекторні засоби. Код АТХ С05С Х.

**Фармакологічні характеристики.**

*Фармакодинаміка.*

Препарат чинить пряму антикоагулянтну дію, знижує в'язкість крові, зменшує проникність судинної стінки, нормалізує мікроциркуляторний гемостаз, покращує функціональний стан ішемізованих тканин, також виявляє протизапальну, тромболітичну і регенеруючу дію.

Мазева основа - пропіленгліколь - забезпечує проникність емоксипіну на глибину розташування поверхневих судин.

*Фармакокінетика.*

Максимальне вивільнення діючої речовини розпочинається з 30-ї хвилини після нанесення мазі і досягає максимальної концентрації через 1,5 години. Ця концентрація утримується протягом 6-8 годин.

## **Клінічні характеристики.**

### ***Показання.***

У складі комплексного лікування: поверхневий гострий тромбофлебіт, гострий аноректальний тромбоз, післяін'єкційний флебіт.

### ***Протипоказання.***

Підвищена індивідуальна чутливість до складових препарату.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Не рекомендується одночасне застосування з розчинами солей важких металів для запобігання утворення важкорозчинних комплексів.

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

### ***Особливості застосування.***

При наявності відкритих ушкоджень мазь наносять тільки на прилеглі тканини.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Оскільки досвід застосування препарату у період вагітності або годування груддю обмежений, призначення мазі можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Дорослим мазь наносити на уражену шкіру тонким шаром (0,1 г/см<sup>2</sup>) 3 рази на добу. При аноректальному тромбозі 1-3 г мазі наносити 2 рази на добу. Курс лікування – 5-10 днів.

### ***Діти.***

Безпека та ефективність застосування препарату дітям не вивчені, тому не слід призначати

Антитромб цій віковій категорії пацієнтів.

***Передозування.***

Не спостерігалось.

***Побічні реакції.***

При нанесенні мазі на шкіру можливе виникнення легкого печіння та подразнення шкіри, що зникають через 2-3 хв. Можливий розвиток реакцій гіперчутливості.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.*

***Термін придатності.*** 3 роки.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 30 г у тубах № 1.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.***

АТ «Лубнифарм».

***Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.***

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по медицинскому применению лекарственного средства**

### **АНТИТРОМБ**

#### **Состав:**

*действующее вещество:* эмоксипин;

1 г мази содержит эмоксипина 10 мг;

*вспомогательные вещества:* масло касторовое, пропиленгликоль, эмульгатор № 1, бронитрол, вода очищенная;

*вспомогательные вещества, входящие в состав эмульгатора № 1:* спирт цетиловый, спирт стеариловый.

**Лекарственная форма.** Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* мазь белого цвета, однородной консистенции, со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Капилляропротекторные средства. Код АТХ С05С Х.

**Фармакологические свойства.**

*Фармакодинамика.*

Препарат оказывает прямое антикоагулянтное действие, снижает вязкость крови, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, нормализует микроциркуляторный гемостаз, улучшает функциональное состояние ишемизированных тканей, также оказывает противовоспалительное, тромболитическое и регенерирующее действие.

Мазевая основа - пропиленгликоль - обеспечивает проницаемость эмоксипина на глубину расположения поверхностных сосудов.

*Фармакокинетика.*

Максимальное высвобождение действующего вещества начинается с 30-й минуты после нанесения мази и достигает максимальной концентрации через 1,5 часа. Эта концентрация держится в течение 6-8 часов.

## **Клинические характеристики.**

### ***Показания.***

В составе комплексного лечения: поверхностный острый тромбофлебит, острый аноректальный тромбоз, послеинъекционный флебит.

### ***Противопоказания.***

Повышенная индивидуальная чувствительность к составляющим препарата.

### ***Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.***

Не рекомендуется одновременное применение с растворами солей тяжелых металлов для предотвращения образования тяжелорастворимых комплексов.

*При одновременном применении каких-либо других лекарственных средств нужно сообщить врачу.*

### ***Особенности применения.***

При наличии открытых повреждений мазь наносят только на прилегающие ткани.

### ***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Поскольку опыт применения препарата в период беременности или кормления грудью ограничен, назначение мази возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.*

Не влияет.

### ***Способ применения и дозы.***

Взрослым мазь наносить на пораженную кожу тонким слоем (0,1 г/см<sup>2</sup>) 3 раза в сутки. При аноректальном тромбозе 1-3 г мази наносить 2 раза в сутки. Курс лечения – 5-10 дней.

*Дети.*

Безопасность и эффективность применения препарата детям не изучены, поэтому не следует назначать Антитромб этой возрастной категории пациентов.

***Передозировка.***

Не наблюдалась.

***Побочные реакции.***

При нанесении мази на кожу возможно возникновение легкого жжения и раздражение кожи, которые исчезают через 2-3 мин. Возможно развитие реакций гиперчувствительности.

*В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.*

***Срок годности.***

3 года.

***Условия хранения.***

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

***Упаковка.***

По 30 г в тубах № 1.

***Категория отпуска.***

Без рецепта.

***Производитель.***

АО «Лубныфарм».

**Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.**

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.