ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ

(RHIZOMATA ET RADICES INULAE)

Склад:

діюча речовина: оману кореневища з коренями (Rhizomata et radices Inulae);

1 пачка містить оману кореневища з коренями (Rhizomata et radices Inulae) – 50 г; 1 фільтр-пакет містить оману кореневища з коренями (Rhizomata et radices Inulae) – 4 г.

Лікарська форма. Кореневища з коренями.

Основні фізико-хімічні властивості:

подрібнена сировина: шматочки коренів та кореневищ різної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-бурий, жовтувато-білий, жовтувато-сірий. Запах приємний. Смак пряний, гіркуватий;

порошок крупний: шматочки коренів та кореневищ різної форми, розміром 3-4 мм. Колір сірувато-бурий, жовтувато-білий, жовтувато-сірий. Запах приємний. Смак пряний, гіркуватий.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, антимікробну, жовчогінну, сечогінну, тонізуючу дії; нормалізують моторну і секреторну функції різних відділів шлунково-кишкового тракту, поліпшують обмін речовин.

Фармакокінетика.

Фармакокінетика не визначалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти, гострі респіраторні захворювання, пневмонії); захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрити, ентероколіти, відсутність апетиту, розлади травлення).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Тяжкі захворювання серцево-судинної системи, нирок.

Особливі заходи безпеки.

Відсутні.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не рекомендується одночасне застосування з протикашльовими лікарськими засобами (у т.ч. лікарськими засобами, що містить кодеїн, декстрометорфан).

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю протипоказане застосування препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку кореневищ і коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі протягом 10 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об’єм відвару довести кип’яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½ склянки, дітям віком 12-14 років – по ⅓ склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці. Перед прийомом відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і

настоювати 15-20 хвилин. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 100 мл, дітям віком 12-14 років – по ⅓ склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування.

Передозування та тривале застосування спричиняють запалення слизових оболонок травного тракту, сечовивідних шляхів, головний біль.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, набряк), печія, біль у животі. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений відвар (настій) – у прохолодному (8-15°С) місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 4 г у фільтр-пакеті №12 або по 4 г у фільтр-пакеті №20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

69050,Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Заявник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.