

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

## РОТОКАН

### **Склад:**

1 флакон містить:

*діючі речовини:* екстракт рідкий (1:1) із лікарської рослинної сировини: ромашки квіток (*flores chamomile*), нагідок квіток (*flores calendulae*), деревію (*herba millefolii*) (2:1:1) – 55 мл або 110 мл;

*допоміжні речовини:* етанол (96 %), вода очищена.

**Лікарська форма.** Екстракт рідкий.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина темно-коричневого кольору з оранжевим відтінком, зі специфічним запахом. При зберіганні допускається утворення осаду.

### **Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Препарати, що застосовуються у стоматології. Код АТХ А01А D11.

### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Комбінований рослинний препарат, дія якого зумовлена фізіологічно активними речовинами, які входять до його складу, чинять протизапальну, протимікробну та спазмолітичну дію, а також знижують проникність капілярів, посилюють і прискорюють процеси регенерації слизових оболонок (покращують трофічні процеси) і мають помірні гемостатичні властивості.

Препарат позитивно впливає на трофіку слизової оболонки шлунка, чинить спазмолітичну дію.

Ротокан чинить ранозагоювальну та антиоксидантну дію.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

У стоматологічній практиці при запальних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота (афтозний та інші стоматити, виразково-некротичний гінгівостоматит).

У складі комбінованої терапії при лікуванні захворювань органів травлення (хронічних гастритів, дуоденітів, функціональної диспепсії, хронічних колітів).

### ***Протипоказання.***

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу.

При пероральному застосуванні – підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

### ***Особливості застосування.***

Без консультації лікаря не застосовувати препарат довше встановленого терміну. Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або ж навпаки – стан здоров'я погіршився, з'явилися небажані явища, потрібно звернутися до лікаря за консультацією щодо подальшого застосування препарату.

При застосуванні – не перевищувати рекомендовані дози.

При виразковій хворобі і гастриті з підвищеною кислотністю застосовувати разом з антацидами і спазмолітиками.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності або годування груддю лікарський засіб застосовувати лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не досліджувалася.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Перед застосуванням дорослим та дітям віком від 12 років 1 чайну ложку (5 мл) Ротокану

розчинити в 1 склянці теплої води.

Пародонтоз лікувати місцево після видалення зубних відкладень та інструментальної обробки патологічних ясенних кишень. У ясенні кишень вводити на 20 хвилин тонкі турунди, добре змочені приготовленим розчином препарату. Процедуру слід проводити щоденно або через день (4-6 разів).

При стоматитах та інших захворюваннях слизової оболонки порожнини рота препарат призначати у вигляді аплікацій із приготовленого розчину препарату тривалістю 15-20 хвилин або ротових ванночок з такого ж розчину тривалістю 1-2 хвилини. Застосовують 2-3 рази на добу протягом 2-5 днів.

У гастроентерології Ротокан приймати всередину та застосовувати у мікроклізмах.

Всередину застосовувати по  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$  склянки розчину з розрахунку 1 чайна ложка Ротокану на 1 склянку теплої кип'яченої води за 30 хвилин до їди або через 40-60 хвилин після їди 3-4 рази на добу.

Для мікроклізм: 1 чайна ложка препарату на 50-100 мл теплої кип'яченої води (після очищення кишечника) 1-2 рази на добу. Курс лікування становить 15-20 днів. Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого терапевтичного ефекту та перебігу захворювання.

*Діти.*

Дітям віком до 12 років препарат не застосовувати.

### ***Передозування.***

Випадки передозування не описані.

Можливе посилення побічних реакцій.

При пероральному застосуванні передозування супроводжується гострим алкогольним отруєнням, симптоми якого аналогічні до симптомів отруєння етиловим спиртом.

*Лікування:* промивання шлунка, симптоматична терапія.

### ***Побічні реакції.***

В осіб із підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції, набрякання шкіри, почервоніння шкіри, висипання, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок.

У разі виникнення будь-яких негативних реакцій слід припинити застосування Ротокану і звернутися до лікаря щодо подальшого його застосування.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 55 мл або 110 мл у флаконах № 1.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

АТ «Лубнифарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.