

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЛЬОНУ НАСІННЯ

(LINI SEMINA)

Склад:

діюча речовина: льону насіння (*Lini semina*);

1 пачка містить: льону насіння (*Lini semina*) 100 г або 200 г;

1 пакет містить: льону насіння (*Lini semina*) 15 г.

Лікарська форма. Насіння.

Основні фізико-хімічні властивості: насіння сплюснуте, яйцеподібної форми, загострене з одного кінця і округле з іншого, нерівнобоке; поверхня насіння гладенька, блискуча; колір від світло-жовтого до темно-коричневого.

Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування кислотозалежних захворювань.

Код АТХ А02Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять обволікаючу, протизапальну і легку проносну дію, вкриваючи тонким шаром слизові оболонки травного тракту та запобігаючи їх подразненню.

Клінічні характеристики.

Показання.

У складі комплексної терапії захворювань слизових оболонок травного тракту (ентерити, коліти, езофагіти, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки), запальних процесів шкіри (фурункульоз, абсцеси).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гострий та хронічний холецистит у стадії загострення; непрохідність кишечника.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 чайну ложку насіння залити 100 мл окропу і збовтувати протягом 15 хв, процідити. Внутрішньо застосовувати тільки свіжоприготований препарат у теплого вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ¼ склянки, дітям 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Зовнішньо застосовувати сухе нагріте насіння у полотняних мішечках або свіжоперемелене, запарене у невеликій кількості окропу у вигляді припарок при фурункулах та абсцесах для прискорення їх дозрівання.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

Діти. Застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Передозування. При передозуванні можлива діарея.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції, при тривалому застосуванні – діарея та больовий синдром. При виникненні побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 100 г або по 200 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 15 г у пакетах.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.