

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

**Судокрем**

**(Sudocrem®)**

## **Склад:**

*діючі речовини:* 1 г крему містить цинку оксид 15,29 % м/м, бензиловий спирт 0,39 % м/м, бензилбензоат 1,02 % м/м, бензил цинамат 0,15 % м/м;

*допоміжні речовини:* ланолін, вода очищена, натрію бензоат (Е 211), віск парафіновий, віск бджолиний синтетичний, віск мікрокристалічний, сорбітансесквіолеат, пропіленгліколь, линалілацетат, ароматизатор лаванди, олія мінеральна, антиоксидант, що містить: пропіленгліколь, кислоту лимонну безводну, бутилгідроксіанізол (Е 320).

**Лікарська форма.** Крем для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білий, гомогенний крем, без видимих домішок, із запахом лаванди.

**Фармакотерапевтична група.** Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшуючою та захисною дією. Препарати цинку. Код АТХ D02A B.

## **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Цинку оксид чинить антисептичну, в'яжучу, протизапальну дію. При нанесенні на шкіру знімає подразнення та заживлює незначні опіки, неглибокі рани.

Бензиловий спирт має місцеву анестезуючу дію з дезінфікуючими властивостями.

Бензил бензоат має антисептичну дію, також діє як розчинна речовина.

Бензил цинамат є синтезованою речовиною з бензилового спирту та коричної кислоти, яка має антибактеріальну та протигрибкову дію.

## **Клінічні характеристики.**

### ***Показання.***

Для місцевого лікування:

- пелюшкового дерматиту;
- попрілостей;
- незначних термічних опіків;
- відмороження I ступеня;
- акне;
- пролежнів;
- екземи.

### ***Протипоказання.***

Гіперчутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Гострі гнійно-запальні захворювання шкіри.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.*** Невідома.

### ***Особливості застосування.***

Тільки для зовнішнього застосування. Не допускати контакту з очима та слизовими оболонками. При потраплянні в очі та на слизові оболонки їх необхідно промити водою.

Не можна курити або перебувати біля відкритого полум'я через небезпеку сильних опіків. Тканина (одяг, постільна білизна, пов'язка тощо), яка контактувала з цим лікарським засобом, легше горить і становить серйозну небезпеку через ризик займання. Прання одягу і постільної білизни може зменшити накопичення препарату, але не може видалити його повністю.

Натрію бензоат може спричинити місцеве подразнення та посилити жовтяницю (пожовтіння шкіри та очей) у новонароджених (віком до 4 тижнів).

Якщо стан після застосування крему не поліпшується або навіть погіршується, слід порадитися з лікарем.

*Застосування у період вагітності та годування груддю.*

Протипоказання відсутні. Можна застосовувати у період вагітності або годування груддю після консультації з лікарем.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не встановлена.*

### ***Спосіб застосування та дози.***

Тільки для зовнішнього застосування.

Якщо не призначено інше, застосовувати дорослим та дітям не частіше 6 разів на добу. Крем слід наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри.

Тривалість лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання і визначається індивідуально лікарем.

Якщо стан після застосування лікарського засобу не поліпшується, або навіть погіршується, слід звернутися до лікаря.

*Діти.*

Лікарський засіб можна застосовувати у педіатричній практиці.

### ***Передозування.***

При місцевому застосуванні передозування малоймовірне. При випадковому прийомі всередину у великих дозах можуть виникати блювання, діарея, стимуляція центральної нервової системи і судоми.

Лікування симптоматичне.

### ***Побічні реакції.***

Рідко можуть виникати реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, гіперемію, висипи, зміни у місці нанесення крему; допоміжні речовини, що входять до складу лікарського засобу, можуть спричинити подразнення шкіри та місцеві шкірні реакції (наприклад, контактний дерматит).

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 45 г або 60 г, або 75 г, або 125 г, або 150 г, або 250 г, або 300 г у поліпропіленовій баночці з контролем першого відкриття.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

Балканфарма-Троян АД.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Вул. Крайречна 1, Троян, 5600, Болгарія.