ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ІХТІОЛ

Склад:

діюча речовина: іхтаммол;

1 г мазі містить іхтаммолу 200 мг;

допоміжні речовини: парафін білий м’який, гліцерин.

Лікарська форма. Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: густа однорідна маса чорно-коричневого кольору із специфічним запахом іхтіолу.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Іхтіолова мазь чинить місцеву знеболювальну, протизапальну та антисептичну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Опіки, екземи, бешихове запалення, невралгії, артрити.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів мазі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні з іншими препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбаченим ефектом. Тому не слід застосовувати препарат одночасно з іншими засобами для зовнішнього застосування.

Несумісний з розчинами йодистих солей, алкалоїдів, солей важких металів.

Особливості застосування.

Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити для запобігання потраплянню залишків мазі в очі, ніс, рот та на слизові оболонки.

Не можна допускати попадання мазі в очі та на слизові оболонки.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінкам у період годування груддю не допускати потрапляння мазі на соски. Безпека та ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчались.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати зовнішньо. Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу, прикриваючи пов’язкою. Тривалість курсу лікування зумовлена перебігом захворювання та ефективністю терапії.

Діти.

Досвіду застосування препарату для лікування дітей немає.

Передозування.

За умов додержання рекомендацій передозування неможливе.

Побічні реакції.

Можливі місцеві або генералізовані прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипання, свербіж, печіння, почервоніння, подразнення шкіри, частіше на початку лікування або при тривалому застосуванні. При появі подразнення шкіри чи інших реакцій застосування мазі слід припинити.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у тубах № 1 або банках.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ИХТИОЛ

Состав:

действующее вещество: ихтаммол;

1 г мази содержат ихтаммола 200 мг;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, глицерин.

Лекарственная форма. Мазь.

Основные физико-химические свойства: густая однородная масса черно-коричневого цвета со специфическим запахом ихтиола.

Фармакотерапевтическая группа.

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X10.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Ихтиоловая мазь оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и антисептическое действие.

Клинические характеристики.

Показания.

Ожоги, экземы, рожистое воспаление, невралгии, артриты.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам мази.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении с другими препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом. Поэтому не следует применять препарат одновременно с другими средствами для наружного применения.

Несовместим с растворами йодистых солей, алкалоидов, солей тяжелых металлов.

Особенности применения.

Руки после нанесения мази нужно тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков мази в глаза, нос, рот и на слизистые оболочки.

Нельзя допускать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Женщинам в период кормления грудью не допускать попадания мази на соски. Безопасность и эффективность препарата в период беременности и кормления грудью не изучались.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

Применять наружно. Мазь наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки, прикрывая повязкой. Продолжительность курса лечения обусловлена течением заболевания и эффективностью терапии.

Дети.

Опыта применения препарата у детей нет.

Передозировка.

При условиях соблюдения рекомендаций передозировка не возможна.

Побочные реакции.

Возможны местные или генерализованные проявления аллергические реакций, включая кожую сыпь, зуд, жжение, покраснение, раздражение кожи, чаще в начале лечения или при длительном применении. При появлении раздражения кожи или других реакций применение мази следует прекратить.

Срок годности.

5 лет.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 25 г в тубах № 1 или банках.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

АО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.