

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ШАВЛІЇ НАСТОЙКА

(SALVIAE TINCTURA)

Склад:

діюча речовина: настойка шавлії листя;

1 флакон містить настойки шавлії листя (*Salviae folia*) (1:5) (екстрагент – етанол 70 %) 40 мл.

Лікарська форма. Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленувато-бурого кольору, зі специфічним ароматним запахом; при зберіганні допускається утворення осаду.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що сприяють загоюванню (рубцюванню) ран і виразок. Код АТХ D03A X.

Фармакологічні властивості.

Біологічно активні речовини шавлії листя (ефірна олія, дубильні речовини, сапоніни, фітонциди, смоли) чинять протимікробну, протизапальну, в'яжучу, дезінфікуючу дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

- Запальні захворювання слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт, пародонтит), глотки, мигдаликів (фарингіт, тонзиліт), верхніх дихальних шляхів.
- Інфіковані рани, порізи, опіки шкіри.

Протипоказання.

Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Шавлії настойка посилює дію інших протизапальних засобів.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Перед застосуванням збовтати.

Для полоскання порожнини рота застосовувати у вигляді свіжоприготованого розчину: 1 чайну ложку шавлії настойки розвести у склянці теплої кип'яченої води.

Для місцевих аплікацій розвести 20-60 крапель настойки в 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.

Тривалість курсу лікування залежить від характеру захворювання, досягнутого лікувального ефекту та становить 7-14 діб.

Діти.

Клінічний досвід застосування препарату дітям віком до 12 років відсутній.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції (у т. ч. почервоніння та набряк шкіри, висипання, свербіж).

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 40 мл у флаконі в пачці або по 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.