

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**УРОХОЛУМ®**  
**(UROCHOLUM)**

**Склад:**

діючі речовини: 1 капсула містить 50 мг урохолуму екстракту сухого, отриманого із водно-спиртового екстракту (1 : 1) (екстрагент — етанол 40 %) із суміші: моркви дикої плодів (*Dauci carotae fructus*) — 200 мг, ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) — 180 мг, споришу трави (*Polygoni avicularis herba*) — 150 мг, кукурудзи стовпчиків з приймочками (*Zea maydis styli cum stigmatis*) — 120 мг, бузини чорної квіток (*Sambuci nigrae flores*) — 100 мг, хвоща трави (*Equiseti herba*) — 100 мг, хмелю шишок (*Lupuli flos*) — 50 мг, берези бруньок (*Betulae gummæ*) — 50 мг, звіробою трави (*Hyperici herba*) — 40 мг, м'яти листя (*Menthae piperitae folia*) — 10 мг; 2 % мальтодекстрину;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію стеарат;

капсула тверда желатинова: желатин, титану діоксид (Е 171), заліза оксид (Е 172), азорубін (Е 122), індиготин (Е 132), синій патентований V (Е 131).

**Лікарська форма.** Капсули.

Основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули з корпусом солом'яного кольору і темно-зеленою кришкою. Вміст капсул — порошок від світло-жовтого до коричневого кольору, що містить невеликі часточки від світлого до темного кольору. Допускається наявність агломератів часток.

**Фармакотерапевтична група.** Інші засоби, що застосовуються в урології.

Код ATX G04B X.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Препарат рослинного походження. Комплекс біологічно активних речовин урохолуму, легко всмоктуючись у кров та стимулюючи нирковий та печінковий кровообіг, сприяє збільшенню сечо- та жовчовиділення, нормалізує тонус гладенької мускулатури верхніх сечовивідних

шляхів і жовчного міхура, послаблює запальні процеси, чинить бактерицидну, діуретичну, жовчогінну, спазмолітичну дії.

Урохолум чинить антиазотемічний ефект, виводить з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди. Сприяє виведенню піску та каменів з нирок, сечового та жовчного міхурів.

#### **Фармакокінетика.**

Не вивчалась.

#### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

Застосовувати у складі комплексної терапії гострих та хронічних захворювань (неспецифічної інфекції) сечовивідних шляхів (цистит, уретрит) та нирок (піелонефрит), хронічних неінфекційних захворювань нирок (нефрит, нефроз); сечокам'яної, нирковокам'яної хвороби та сольового діатезу (для профілактики утворення конкрементів, в т. ч. після їх видалення); хронічного холециститу, дискінезії жовчовивідних шляхів.

#### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Зміна реологічних властивостей крові, обтураційна жовтяниця.

#### **Особливі заходи безпеки.**

З обережністю застосовувати пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (через можливе виникнення або посилення печії).

Не застосовувати лікарський засіб, якщо діаметр каменів перевищує 3 мм.

#### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не встановлена.

#### **Особливості застосування.**

Капсула желатинова містить азорубін (Е 122), який може спричиняти алергічні реакції.

Препарат містить лактозу, тому, якщо у вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Лікарський засіб не застосовують у період вагітності та годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не вивчалась.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати перед вживанням їжі по 1 капсулі тричі на добу. Капсули слід ковтати не розжовуючи, з достатньою кількістю рідини (наприклад склянка води). Курс лікування визначається лікарем із врахуванням перебігу захворювання, характеру супутньої терапії та триває від 5 діб до 1 місяця. За призначенням лікаря курс терапії можна повторити.

### *Діти.*

Лікарський засіб не застосовують дітям віком до 12 років.

### ***Передозування.***

Посилення побічних реакцій.

*Лікування:* при передозуванні необхідно призначити велику кількість теплого пиття та провести симптоматичне лікування.

### ***Побічні реакції.***

*З боку нервової системи:* частота невідома — запаморочення.

*З боку шлунково-кишкового тракту:* частота невідома — диспептичні явища (нудота, блювання).

*З боку шкіри та підшкірної тканини:* частота невідома — алергічні реакції (у т. ч. висипання, свербіж, гіперемія, набряк шкіри).

***Термін придатності.*** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 10 капсул у блістері; по 2 або по 4, або по 6, або по 9 блістерів у коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.**Виробник.**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.