

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ЛІНКАС ПАСТИЛКИ

(LINKUS LOZENGES)

#### **Склад:**

*діючі речовини:* кожна пастилка містить: екстракту адхатоди судинної листя густого (*Adhatoda sudina* Ness.) (4~5:1) (екстрагент вода) – 30,0 мг; екстракту солодки голої коренів густого (*Glycyrrhiza glabra* L.) (4~5:1) (екстрагент вода) – 7,0 мг; екстракту перцю довгого плодів густого (*Piper longum* L.) (4~5:1) (екстрагент вода) – 6,0 мг; екстракту фіалки духмяної квіток густого (*Viola odorata* L.) (4~5:1) (екстрагент вода) – 2,0 мг; екстракту іссопа лікарського листя густого (*Hyssopus officinalis* L.) (4~5:1) (екстрагент вода) – 3,0 мг; екстракту калгану великого кореневищ густого (*Alpinia galanga* (L.) Willd.) (4~5:1) (екстрагент вода) – 3,0 мг;

*допоміжні речовини:* ментол, олія евкаліптова, сахароза, глюкози розчин, кислота лимонна безводна, есенція таблеточна апельсинова або есенція таблеточна медово-лимонна, тальк, парафін, віск жовтий, ланолін, парафін білий м'який, олія мінеральна.

**Лікарська форма.** Пастилки зі смаком апельсина, меду та лимона.

*Основні фізико-хімічні властивості:* круглі пастилки коричневого кольору зі смаком апельсина або зі смаком меду та лимону. Нижні і верхні поверхні пастилок мають нерівності. У карамелевій масі допускаються включення дрібних повітряних бульбашок. На поверхні пастилок можлива наявність незначного білого нальоту.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Комбінації. Код АТХ R05C A10.

#### **Фармакологічні властивості.**

##### *Фармакодинаміка.*

Комплексний препарат на основі лікарських трав із протизапальними, відхаркувальними, муколітичними, спазмолітичними та жарознижувальними властивостями. Активує секреторну функцію епітелію дихальних шляхів, змінює поверхневу активність легеневого сурфактанта, стимулює функцію ворсинок епітелію, що позитивно впливає на ексудативну та проліферативну фази запалення. Розріджує густе мокротиння та полегшує відходження слизу з дихальних шляхів. На слизові оболонки глотки та бронхів діє як місцевий антисептик, захищає їх від дії

патогенних мікроорганізмів. Застосування лікарського засобу знижує тонус гладких м'язів бронхіол та трахеї, збільшує розмір бронхіол та альвеолярних мішечків, зменшує набряки слизових оболонок. Зміни вираженості кашлю відмічаються через 3–4 дні застосування лікарського засобу.

*Адхатода судинна* – містить алкалоїд вазицин, що має антисептичні властивості і чинить відхаркувальну дію.

*Солодка гола* – відхаркувальна, спазмолітична, широка протизапальна дія.

*Перець довгий* – ефективний при лікуванні кашлю, бронхіальної астми, коклюшу.

*Фіалка запашна* – відхаркувальна, протизапальна, антимікробна, сечогінна, беззаспокійлива, заспокійлива дія.

*Іссон лікарський* – чинить антисептичну, протикашльову дію. Стимулює травлення і знімає спазм гладкої мускулатури шлунково-кишкового тракту.

*Фармакокінетика.*

Дані з фармакокінетики відсутні.

## **Клінічні характеристики.**

### ***Показання.***

Симптоматична терапія запальних захворювань дихальних шляхів, які супроводжуються сухим подразнювальним кашлем та болем у горлі, а саме: бронхіту (гострого та хронічного); фарингіту, трахеїту, трахеобронхіту.

### ***Протипоказання.***

Лікарський засіб протипоказаний при підвищеній чутливості до його складових, цукровому діабеті, органічних ураженнях серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальній гіпертензії; порушеннях функції печінки та нирок; гіпокаліємії; важкому ступені ожиріння. Лікарський засіб протипоказаний дітям до 6 років.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Не рекомендується одночасне застосування лікарського засобу з протикашльовими ліками (наприклад, з кодеїном), які зменшують відходження мокротиння. При необхідності застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

### ***Особливості застосування.***

*Важлива інформація про допоміжні речовини.*

До складу лікарського засобу входить цукор, на що необхідно звернути увагу хворим на цукровий діабет та пацієнтам, які перебувають на гіпокалорійній дієті. Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб. Може бути шкідливим для зубів.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Застосування в період вагітності та годування груддю протипоказане, оскільки лікарський засіб чинить естрогеноподібну дію, солодка гола, яка входить до складу лікарського засобу, підвищує рівень естрогенів, внаслідок чого порушується гормональний баланс. У разі необхідності прийому лікарського засобу годування груддю слід припинити.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не чинить впливу на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

***Спосіб застосування та дози.***

Дорослим повільно розсмоктувати до повного розчинення по 1 пастильці кожні 2–3 години. Діти від 6 років: по 1 пастильці 4 рази на день. Максимальна добова доза – 8 пастилок.

Тривалість лікування – 3–5 днів.

*Діти.* Лікарський засіб не призначати дітям до 6 років.

***Передозування.***

Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може викликати порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.

Повідомлень щодо випадкового передозування не надходило.

***Побічні реакції.***

При застосуванні лікарського засобу можливі слабкість, підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія, алергічні реакції (у тому числі висипання (макульозний висип), гіперемія шкіри, анулярна еритема, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк).

*У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій припинити прийом лікарського засобу і звернутися до лікаря.*

**Повідомлення про підозрювані побічні реакції.**

Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу є важливою процедурою. Це дозволяє продовжувати моніторинг співвідношення «користь/ризик» для відповідного лікарського засобу. Медичним працівникам необхідно повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему фармаконагляду.

-

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 8 пастилок у блістері, 2 блістери у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед/

Herbion Pakistan Private Limited.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

LF-37/A-3, Промислова зона Ландхі, Карачі, Пакистан/

LF-37/A-3, Landhi Industrial area, Karachi, Pakistan.