ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ПОЛИНУ ГІРКОГО ТРАВА

(HERBA ARTEMISIAE ABSINTHII)

Склад:

діюча речовина: трава полину гіркого (Herba Artemisiae absinthii);

1 пачка містить трави полину гіркого (Herba Artemisiae absinthii) – 50 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості: квіткові корзинки, шматочки стебел та листків різноманітної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-зелений. Запах приємний, своєрідний, сильний. Смак пряно-гіркий.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для підвищення апетиту. Код АТХ А15.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату збуджують апетит, стимулюють функцію залоз органів травлення, підвищують секрецію жовчі, панкреатичного і шлункового соків, чинять протизапальну, антисептичну дію.

Фармакокінетика.

Фармакокінетика не визначалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Для підвищення апетиту і покращення секреторної діяльності органів травлення при гастритах із пониженою секреторною функцією шлунка; у складі комплексної терапії холециститів, дискінезій жовчних шляхів.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, жовчокам'яна хвороба; наявність в анамнезі кровотеч з органів малого таза; анемія; епілепсія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано (препарат підвищує тонус матки).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

2 чайні ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді за 30 хвилин до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу.

Курс лікування – 2-3 тижні. За призначенням лікаря курс можна повторювати. Між курсами обов'язкові перерви до 2 місяців.

Діти.

Препарат застосовують дітям від 5 років за призначенням лікаря.

Передозування.

При тривалому застосуванні можливі атонічні запори. Прийом у підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій та спричинити так звану «полинну» епілепсію. Лікування симптоматичне.

Побічні реакції.

Можливі реакції підвищеної чутливості (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж), нудота, блювання. При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

69050,Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Заявник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75