

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

## АПІПРОСТ

### **Склад:**

*діючі речовини:* фенольний гідрофобний препарат прополісу, пилок квітковий;

1 капсула містить фенольного гідрофобного препарату прополісу у перерахуванні на 100 % вміст суми фенольних сполук 60 мг, пилку квіткового 100 мг;

*допоміжні речовини:* кремнію діоксид колоїдний безводний; целюлоза мікрокристалічна; оболонка капсули містить еритрозин (Е 127), титану діоксид (Е 171), хіноліновий жовтий (Е 104), індигокармін (Е 132), желатин.

**Лікарська форма.** Капсули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* тверді желатинові капсули з жовтим непрозорим корпусом і зеленою непрозорою кришкою. Вміст капсули – суміш порошку жовто-коричневого кольору зі специфічним запахом з темними та світлими включеннями. Допускається наявність агломератів часток.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що застосовуються в урології. Інші препарати, включаючи комбінації. Код АТХ G04В Х.

### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Комплексний препарат на основі продуктів бджільництва, що містить фенольний гідрофобний препарат прополісу (ФГПП) і пилок квітковий. До складу ФГПП входять флавоноїди (апігенін, лютеолін, робіданол), флавоноли (кверцетин, кемпферол), оксикумарини, фенолокарбонові кислоти. Пилок квітковий містить білки і вільні амінокислоти, нуклеїнові кислоти, ліпідні компоненти (тригліцериди, фосфоліпіди, ненасичені жирні кислоти), фітостерини, вітаміни ( $\beta$ -каротин, Е, С, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, РР), макро- і мікроелементи (калій, кальцій, магній, залізо, цинк, мідь, кобальт, фосфор, марганець, сірка, срібло, нікель, натрій, хлор), фенольні сполуки (катехіни, флавоноїди, антоціани, лейкоантоціани, аурони, халкони і фенолокислоти), фітогормони (брасини), вуглеводи (переважно фруктоза і глюкоза), ферменти. Склад препарату обумовлює широкий спектр його фармакологічних властивостей: протизапальну, антиоксидантну, мембранопротекторну, знеболювальну, репаративну активність і коригувальний вплив на рівень андрогенів. Фармакологічні ефекти ФГПП і пилку

квіткового забезпечують вплив на основні ланки патогенезу простатиту: сприяють регенерації клітин передміхурової залози, послаблюють больові відчуття та усувають запалення.

Препарат не чинить токсичної дії на сперматогенез. Не впливає на клітинну і гуморальну ланки імунітету, не виявляє місцевоподразнювальної, мутагенної, кумулятивної, ульцерогенної дії. Препарат не впливає на секреторну активність залоз шлунка і не чинить токсичної дії на функції життєво важливих органів і систем організму при тривалому застосуванні.

### **Клінічні характеристики.**

**Показання.** У складі комплексної терапії гострого і хронічного бактеріального простатиту, хронічного небактеріального простатиту/синдрому хронічного тазового болю (запального і незапального), безсимптомного запального простатиту.

Профілактика гострого і рецидивів хронічного простатиту.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату/продуктів бджільництва.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** У разі необхідності сумісного застосування препарату з іншими лікарськими засобами, до складу яких входять важкі метали (наприклад антацидні засоби), спроможні утворювати з ним комплекси, приймати препарати треба з інтервалом не менше 30 хвилин для запобігання взаємодії.

**Особливості застосування.** Перед початком лікування препаратом необхідна консультація лікаря для виключення наявності злоякісного новоутворення у простаті.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Не застосовувати жінкам.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.** Препарат приймати за 30 хвилин до їди.

При гострому бактеріальному простатиті приймати по 2 капсули 3 рази на добу протягом 1 місяця. У разі необхідності курс лікування можна продовжити.

При хронічному бактеріальному простатиті, хронічному небактеріальному простатиті, синдромі хронічного тазового болю (запального і незапального), безсимптомному запальному простатиті приймати по 2 капсули 3 рази на добу протягом 2 місяців. У разі необхідності через 2 тижні перерви курс лікування можна повторити.

Для профілактики рецидивів гострого і хронічного простатиту приймати по 1 капсулі 3 рази на добу протягом 3-4 тижнів 3-4 рази на рік.

*Діти.* Не застосовувати дітям.

**Передозування.** Значне збільшення дози при тривалому застосуванні може спричинити алергічну реакцію і нудоту.

Лікування симптоматичне.

**Побічні реакції.** Можливі нудота, алергічні реакції.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** Капсули № 10×3, № 10×6 у блістерах у коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

Виробник. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.** Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.