

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

КМИНУ ПЛОДИ

(CARVI FRUCTUS)

Склад:

діюча речовина: кмину плоди.

Лікарська форма. Плоди.

Основні фізико-хімічні властивості: окремі напівплодики, іноді цілі плоди сірувато-коричневого або коричневого кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при функціональних розладах кишечника.

Код АТХ А03А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять вітрогінну, спазмолітичну, бактерицидну, відхаркувальну, проносну, жовчогінну та потогінну дію, посилюють лактацію у період годування груддю.

Клінічні характеристики.

Показання.

Метеоризм, атонія кишечника, хронічні холецистити, коліти – у складі комбінованої терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано у період вагітності. Посилює лактацію у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 20 хв до їди (як вітрогінний засіб приймати після їди): дорослим та дітям віком від 14 років по 1/3-1/2 склянки; дітям віком 12-14 років - по 1/4 склянки, 7-12 років - по 2 столових ложки, 3-7 років - по 1 столовій ложці, 1-3 років - по 1 десертній ложці, дітям віком 6 місяців - 1 рік - по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати. Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 6 місяців.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції.

Термін придатності. 3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.