

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ГРИЦИКІВ ТРАВА

(HERBA BURSÆ PASTORIS)

Склад:

діюча речовина: грициків трава (Herba Bursae pastoris);

1 пачка містить грициків трави (Herba Bursae pastoris) – 40 г або 50 г, або 75 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості:

подрібнена сировина: шматочки листків, стебел та суцвіть різноманітної форми, окремі квітки та плоди, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір стебел, листків та плодів зелений, квіток – білуватий. Запах слабкий. Смак гіркуватий.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що стимулюють тонус та скорочувальну активність міометрія. Код АТХ G02A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини рослини проявляють кровоспинну, в'язучу, протизапальну, гіпотензивну, сечогінну та жовчогінну дію; посилюють скорочувальну діяльність гладкої мускулатури матки, активізують моторику шлунка та прискорюють перистальтику кишечника.

Клінічні характеристики.

Показання.

Атонії матки, маткові кровотечі (у комплексному лікуванні).

Протипоказання.

Підвищене згортання крові, тромбоемболія (в анамнезі). Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідомі.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано (підвищує тонус матки).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді по 1 столовій ложці 4-5 разів на добу після їди.

Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Не рекомендується застосовувати дітям.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

При гіперчутливості до препарату можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При тривалому застосуванні – зниження артеріального тиску, гіперкоагуляція.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 40 г або по 50 г, або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Заявник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.