

## **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

### **Присипка дитяча**

#### **Склад:**

*діюча речовина:* цинку оксид;

1 г порошку містить цинку оксиду – 0,1 г;

*допоміжні речовини:* тальк, крохмаль картопляний.

**Лікарська форма.** Порошок наскірний.

*Основні фізико-хімічні властивості:* порошок білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, дрібний, м'який, жирний на дотик.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією. Препарати цинку. Код АТХ D02A B.

#### **Фармакологічні властивості.**

Адсорбуючий, підсушувальний, антисептичний, протизапальний засіб для зовнішнього застосування. Має високу гігроскопічність, адсорбує виділення потових і сальних залоз, ексудат, зменшує тертя шкірних складок, захищає шкіру від несприятливого зовнішнього впливу.

Цинку оксид спричиняє денатурацію білків та утворення альбумінатів, які пригнічують процес місцевого запалення з ослабленням болісних відчуттів, звужують кровоносні судини, ущільнюють клітинні мембрани. Лікарський засіб зменшує вираженість місцевих явищ запалення і подразнення.

Компоненти препарату не проникають крізь шкіру і не проявляють системної дії.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Попрілості.

***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гострі гнійно-запальні захворювання шкіри, мокнучі ділянки шкіри.

***Особливі заходи безпеки.***

Препарат не застосовують при інфікованих ушкодженнях і гнійничкових захворюваннях шкіри. Поліпшення стану настає після дворазового або триразового застосування препарату. Не застосовувати присипку на вологу шкіру. Не допускати потрапляння препарату в очі, дихальні шляхи та на відкриту поверхню ран.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Не встановлена.

***Особливості застосування.***

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Лікарський засіб застосовують зовнішньо. Присипку дитячу наносять на суху ділянку попірлостей після купання та при замінах пелюшок. Термін лікування залежить від перебігу захворювання, його визначає лікар індивідуально.

Діти.

Застосовують дітям.

**Передозування.**

Не відзначалося.

**Побічні реакції.**

При підвищеній чутливості до препарату можливі алергічні реакції (свербіж, гіперемія, висипання).

**Термін придатності.** 5 років.**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 40 г або по 50 г у банках.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.**Виробник.**

АТ «Лубнифарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.



## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по медицинскому применению лекарственного средства**

### **ПРИСЫПКА ДЕТСКАЯ**

#### ***Состав:***

*действующее вещество:* цинка оксид;

1 г порошка содержит цинка оксида - 0,1 г;

*вспомогательные вещества:* тальк, крахмал картофельный.

**Лекарственная форма.** Порошок накожный.

*Основные физико-химические свойства:* порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета, мелкий, мягкий, жирный на ощупь.

#### **Фармакотерапевтическая группа.**

Дерматологические средства. Препараты со смягчающим и защитным действием. Препараты

цинка. Код АТХ D02A B.

### ***Фармакологические свойства.***

Адсорбирующее, подсушивающее, антисептическое, противовоспалительное средство для наружного применения. Обладает высокой гигроскопичностью, адсорбирует выделение потовых и сальных желез, экссудат, уменьшает трение кожных складок, защищает кожу от неблагоприятного внешнего влияния.

Цинка оксид служит причиной денатурации белков и образования альбуминатов, которые угнетают процесс местного воспаления с ослаблением болевых ощущений, суживают кровеносные сосуды, уплотняют клеточные мембраны. Лекарственное средство уменьшает выраженность местных проявлений воспаления и раздражения.

Компоненты препарата не проникают через кожу и не оказывают системного действия.

### ***Клинические характеристики.***

#### ***Показания.***

Опрелости.

#### ***Противопоказания.***

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острые гнойно-воспалительные заболевания кожи, мокнущие участки кожи.

### ***Особые меры безопасности.***

Препарат не применяют при инфицированных повреждениях и гнойничковых заболеваниях кожи. Улучшение состояния наступает после двукратного или трехкратного применения препарата. Не применять присыпку на влажную кожу. Не допускать попадания препарата в глаза, дыхательные пути и на открытую поверхность ран.

### ***Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.***

Не установлено.

### ***Особенности применения.***

*Применение в период беременности или кормления грудью.*

Применяют.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.*

Не влияет.

### ***Способ применения и дозы.***

Лекарственное средство применяют наружно. Присыпку детскую наносят на сухой участок опрелостей после купания и при смене пеленок.

Срок лечения зависит от течения заболевания, его определяет врач индивидуально.

*Дети.*

Применяют детям.

### ***Передозировка.***

Не отмечалась.

### ***Побочные реакции.***

При повышенной чувствительности к препарату возможны аллергические реакции (зуд, гиперемия, высыпания).

***Срок годности.*** 5 лет.

### ***Условия хранения.***

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.**

По 40 г или по 50 г в банках.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Производитель.**

АО «Лубныфарм».

**Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.**

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.