

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

Присипка дитяча

Склад:

діюча речовина: цинку оксид;

1 г порошку містить цинку оксиду – 0,1 г;

допоміжні речовини: тальк, крохмаль картопляний.

Лікарська форма. Порошок наскірний.

Основні фізико-хімічні властивості: порошок білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, дрібний, м'який, жирний на дотик.

Фармакотерапевтична група.

Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією. Препарати цинку. Код АТХ D02A B.

Фармакологічні властивості.

Адсорбуючий, підсушувальний, антисептичний, протизапальний засіб для зовнішнього застосування. Має високу гігроскопічність, адсорбує виділення потових і сальних залоз, ексудат, зменшує тертя шкірних складок, захищає шкіру від несприятливого зовнішнього впливу.

Цинку оксид спричиняє денатурацію білків та утворення альбумінатів, які пригнічують процес місцевого запалення з ослабленням болісних відчуттів, звужують кровоносні судини, ущільнюють клітинні мембрани. Лікарський засіб зменшує вираженість місцевих явищ запалення і подразнення.

Компоненти препарату не проникають крізь шкіру і не проявляють системної дії.

Клінічні характеристики.

Показання.

Попрілості.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гострі гнійно-запальні захворювання шкіри, мокнучі ділянки шкіри.

Особливі заходи безпеки.

Препарат не застосовують при інфікованих ушкодженнях і гнійничкових захворюваннях шкіри. Поліпшення стану настає після дворазового або триразового застосування препарату. Не застосовувати присипку на вологу шкіру. Не допускати потрапляння препарату в очі, дихальні шляхи та на відкриту поверхню ран.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Лікарський засіб застосовують зовнішньо. Присипку дитячу наносять на суху ділянку попірлостей після купання та при замінах пелюшок. Термін лікування залежить від перебігу захворювання, його визначає лікар індивідуально.

Діти.

Застосовують дітям.

Передозування.

Не відзначалося.

Побічні реакції.

При підвищеній чутливості до препарату можливі алергічні реакції (свербіж, гіперемія, висипання).

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 40 г або по 50 г у банках.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.



ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ПРИСЫПКА ДЕТСКАЯ

Состав:

действующее вещество: цинка оксид;

1 г порошка содержит цинка оксида - 0,1 г;

вспомогательные вещества: тальк, крахмал картофельный.

Лекарственная форма. Порошок накожный.

Основные физико-химические свойства: порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета, мелкий, мягкий, жирный на ощупь.

Фармакотерапевтическая группа.

Дерматологические средства. Препараты со смягчающим и защитным действием. Препараты

цинка. Код АТХ D02A B.

Фармакологические свойства.

Адсорбирующее, подсушивающее, антисептическое, противовоспалительное средство для наружного применения. Обладает высокой гигроскопичностью, адсорбирует выделение потовых и сальных желез, экссудат, уменьшает трение кожных складок, защищает кожу от неблагоприятного внешнего влияния.

Цинка оксид служит причиной денатурации белков и образования альбуминатов, которые угнетают процесс местного воспаления с ослаблением болевых ощущений, суживают кровеносные сосуды, уплотняют клеточные мембраны. Лекарственное средство уменьшает выраженность местных проявлений воспаления и раздражения.

Компоненты препарата не проникают через кожу и не оказывают системного действия.

Клинические характеристики.

Показания.

Опрелости.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острые гнойно-воспалительные заболевания кожи, мокнущие участки кожи.

Особые меры безопасности.

Препарат не применяют при инфицированных повреждениях и гнойничковых заболеваниях кожи. Улучшение состояния наступает после двукратного или трехкратного применения препарата. Не применять присыпку на влажную кожу. Не допускать попадания препарата в глаза, дыхательные пути и на открытую поверхность ран.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Не установлено.

Особенности применения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

Лекарственное средство применяют наружно. Присыпку детскую наносят на сухой участок опрелостей после купания и при смене пеленок.

Срок лечения зависит от течения заболевания, его определяет врач индивидуально.

Дети.

Применяют детям.

Передозировка.

Не отмечалась.

Побочные реакции.

При повышенной чувствительности к препарату возможны аллергические реакции (зуд, гиперемия, высыпания).

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 40 г или по 50 г в банках.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель.

АО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.