

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %

(ETHYL ALCOHOL 70 %)

Склад:

діюча речовина: ethanol;

1 флакон містить не менше 69,3 % об/об і не більше 70,7 % об/об етанолу та воду.

Лікарська форма. Розчин спиртовий для зовнішнього застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста, гігроскопічна рідина.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні і дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.

Фармакокінетика. При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

Клінічні характеристики.

Показання. Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання і компресів. Для хірургічної обробки рук хірургів.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість. Гострі запальні процеси шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

Особливості застосування. У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою. Не допускати потрапляння препарату в очі.

Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності або годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози. Зовнішньо – для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у т. ч. рук.

Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1:1.

Діти. Застосовувати за призначенням лікаря.

Передозування. При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

Побічні реакції. При місцевому застосуванні можливе подразнення шкіри або слизових оболонок.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 мл або 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ'Я».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. Україна,
61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.