

## **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

### **СЕНИ ЛИСТЯ ТА ПЛОДИ**

**(SENNAE FOLIA CUM FRUCTUS)**

#### **Склад:**

*діюча речовина:* сени листя та плоди;

1 пачка містить: сени листя та плодів – 50 г; 1 фільтр-пакет містить: сени листя та плодів – 2 г.

**Лікарська форма.** Листя та плоди.

*Основні фізико-хімічні властивості:*

*подрібнена сировина:* шматочки листя, плодів, насіння, стебел, рахісу, плодоніжок різної форми. Колір листя сірувато-зелений, коричнювато-зелений, жовтувато-зелений, плодів – зелений, зеленувато-коричневий, жовтувато-коричневий, коричневий;

*порошок крупний:* шматочки листя, плодів, насіння, стебел, рахісу, плодоніжок різної форми сірувато-зеленого, коричнювато-зеленого, жовтувато-зеленого, зеленого, зеленувато-коричневого, жовтувато-коричневого, коричневого кольору.

**Фармакотерапевтична група.** Контактні проносні засоби. Код АТХ А06А В06.

#### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Сени листя та плоди містять флавоноїди, антраглікозиди (сенозидин А і В, реїн, алое-емодин), органічні кислоти, смолисті речовини. Цей комплекс біологічно активних речовин чинить м'яку проносну дію. Проносна дія відвару із сени листя та плодів проявляється через 6-10 годин після прийому і зумовлена антраглікозидами, які посилюють моторну функцію товстого кишечника.

#### **Клінічні характеристики.**

**Показання.** Атонія товстого кишечника, хронічні запори.

### ***Протипоказання.***

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Метрорагії, паралітична кишкова непрохідність, геморой, гострі запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт, апендицит), перитоніт, пептична виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, шлунково-кишкові кровотечі, тріщини прямої кишки, спастичний коліт, защемлена грижа, панкреатит, гепатит, нефрит, цистит, біль у животі невстановленого генезу, тяжкі порушення водно-електролітного балансу, нудота, блювання, дивертикуліт, органічні ураження печінки.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Одночасне застосування із хінідину сульфатом знижує рівень діючих речовин у сироватці, із серцевими глікозидами – спричиняє серцеву аритмію, із антиаритмічними засобами, діуретиками та кортикостероїдами – спричиняє м'язову слабкість.

### ***Особливості застосування.***

Перед початком прийому препарату необхідно, щоб лікар встановив причину запору для виключення непрохідності кишечника. Препарат рекомендується застосовувати тільки в тому випадку, якщо нормалізації випорожнення не вдається домогтися зміною дієти або застосуванням препаратів, які збільшують обсяг кишкового вмісту. Щоб уникнути звикання, препарат доцільно чергувати з іншими проносними засобами та обмежити тривалість застосування 1 тижнем.

*Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.*

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.*

### ***Спосіб застосування та дози.***

2 столові ложки листя та плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Витримати при кімнатній температурі до повного охолодження, процідити, залишок віджати до отриманого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Дорослим приймати у теплому вигляді по  $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$  склянки на ніч або по 1 столовій ложці 1–3 рази на добу. Дітям віком 12–14 років – по 1 столовій ложці, 14–16 років – по 2 столових ложки, 16–18 років – по  $\frac{1}{4}$  склянки на ніч. Перед застосуванням відвар рекомендується збовтати.

2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати до повного охолодження. Дорослим приймати внутрішньо по 1 склянці на ніч або по  $\frac{1}{4}$  склянки 1–3 рази на день. Дітям віком 12–14 років – по  $\frac{1}{4}$  склянки, 14–16 років – по  $\frac{1}{3}$

склянки, 16-18 років – по ½ склянки на ніч.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

*Діти.* Препарат застосовувати дітям віком від 12 років за рекомендацією лікаря.

**Передозування.** При передозуванні можливі кишкові коліки, диспепсія, діарея, порушення водно-сольового балансу, що потребує відміни препарату. Лікування симптоматичне. Тривале (до кількох років) застосування великих доз препарату може спричинити атрофію гладкої мускулатури товстої кишки і порушення її іннервації.

**Побічні реакції.** Алергічні реакції (висип, свербіж, кропив'янка, локальна або генералізована екзантема). Порушення травлення, колікоподібні болі в кишечнику, метеоризм, діарея, анорексія, зміна забарвлення сечі, псевдомеланоз кишечника, водно-електролітний дисбаланс (гіпокаліємія, гіпокальціємія), альбумінурія, гематурія, гіперальдостеронізм, порушення серцевої діяльності, підвищена втомлюваність, м'язова слабкість, судоми.

**Термін придатності.** 3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

**Упаковка.** По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2 г у фільтр-пакетах № 20.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/ місцезнаходження заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.