

## **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

### **МАТИ-Й-МАЧУХИ ЛИСТЯ**

**(FOLIA FARFARAE)**

#### **Склад:**

*діюча речовина:* мати-й-мачухи листя (Folia Farfarae);

1 пачка містить мати-й-мачухи листя (Folia Farfarae) – 40 г; 1 пачка містить мати-й-мачухи листя (Folia Farfarae) – 50 г.

**Лікарська форма.** Листя.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки листків різноманітної форми. Колір сірувато-зелений. Без запаху. Смак слабко-гіркуватий із відчуттям слизькості.

**Фармакотерапевтична група.**

Відхаркувальний засіб. Код АТХ R05C A.

#### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, пом'якшувальну, потогінну, спазмолітичну дію; відновлюють активність війчастого епітелію трахеї і бронхів, сприяють розрідженню і відходженню мокротиння, чинять обволікаючу дію на слизову оболонку порожнини рота та гортані, захищаючи її від подразнення.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Захворювання дихальних шляхів (ларингіти, трахеїти, хронічні бронхіти, бронхопневмонії, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба) у складі комплексної терапії.

##### **Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Невідома.

***Особливості застосування.***

***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь від застосування для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

2 десертні ложки листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді дорослим та дітям віком від 14 років – по  $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$  склянки 2-3 рази на добу за 1 годину до їди або по 1 столовій ложці 4-6 разів на добу. Дітям віком 12-14 років – по  $\frac{1}{4}$  склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці 2-3 рази на добу за 1 годину до їди. Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

***Діти.***

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років (за призначенням лікаря).

***Передозування.***

Повідомлень немає.

***Побічні реакції.***

При гіперчутливості можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

**Упаковка.** По 40 г або 50 г у пакеті, вкладеному у пачку.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

**Заявник.** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

**Місцезнаходження заявника.**

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.