

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

## КАТАРІЯ (KATARIA®)

### **Склад:**

*діюча речовина:* натрію цитрат (sodium citrate);

1 саше (5,6 г гранул) містить натрію цитрату 4 г;

*допоміжні речовини:* сахароза, сахарин натрію, смакова добавка журавлина 191121.

**Лікарська форма.** Гранули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білі або майже білі сипучі гранули з приємним запахом.

### **Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються в урології. Код АТХ G04B X.

### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Натрію цитрат метаболізується у бікарбонат, який сприяє регресії дизурії, що спостерігається при циститі, зменшує кислотність сечі, спричиняючи підлужування.

*Фармакокінетика.*

Фармакокінетика натрію цитрату відповідає його природній фармакокінетиці в організмі.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

Полегшення симптомів циститу у жінок.

### ***Протипоказання.***

- Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату.
- Цукровий діабет.
- Захворювання серця.
- Артеріальна гіпертензія.
- Захворювання нирок.
- Перебування на низькосольовій дієті.
- Вагітність, годування груддю.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Слід уникати сумісного застосування препаратів, що містять натрій, хворим, які отримують препарати літію, оскільки натрій переважно абсорбується нирками, що призводить до збільшення екскреції літію і зниження його рівня у плазмі крові.

Не слід одночасно використовувати препарати, що сприяють залуженню сечі, зокрема цитрат натрію, з уротропіном, оскільки він ефективний лише у кислій сечі.

Терапевтичний ефект ряду лікарських засобів може бути зменшений або збільшений при залуженні сечі або зниженні рН шлункового соку, які виникають внаслідок дії цитрату натрію.

### ***Особливості застосування.***

Якщо симптоми зберігаються після двох днів лікування, необхідно звернутися до лікаря. Не перевищувати рекомендовану дозу.

*Допоміжні речовини.* Препарат містить сахарозу. Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Цей лікарський засіб містить 40,8 ммоль (939 мг)/доза натрію. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам, які застосовують натрій-контрольовану дієту.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Протипоказано у період вагітності або годуванню груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не встановлено.

### **Спосіб застосування та дози.**

#### Жінки (дорослі)

Вміст одного саше розчинити у 1 склянці води.

Приймати внутрішньо по 1 саше 3 рази на добу протягом 48 годин.

Приготовлений розчин необхідно використати одразу.

#### Чоловіки та діти

Не рекомендується.

#### Діти.

Не рекомендується.

### **Передозування.**

Передозування препаратом малоімовірне.

*Симптоми:* у випадку надмірного вживання цитрату натрію можуть виникнути відчуття шлунково-кишкового дискомфорту та діарея. Передозування солями натрію може призвести до гіпернатріємії та гіперосмолярності. Надмірне вживання бікарбонатів може призвести до гіпокаліємії та метаболічного алкалозу, особливо у пацієнтів із порушеною функцією нирок.

*Лікування:* симптоматичне, включаючи відповідну корекцію водно-електролітного балансу.

### **Побічні реакції.**

*З боку імунної системи:* реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання.

*З боку шлунково-кишкового тракту:* біль у животі.

*З боку нирок та сечовидільної системи:* помірне посилення діурезу.

**Термін придатності.** 3 роки.

### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 5,6 г гранул у саше. По 6 саше у картонній упаковці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

Кусум Хелтхкер Пвт Лтд/

Kusum Healthcare Pvt Ltd.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

СП-289 (А), РІІКО Індастріал ареа, Чопанкі, Бхіваді, Діст. Алвар (Раджастан), Індія/

SP-289 (A), RIICO Industrial area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), India.

## **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

**КАТАРІЯ**

**(KATARIA®)**

**Склад:**

*діюча речовина:* натрію цитрат (sodium citrate);

1 саше (5,6 г гранул) містить натрію цитрату 4 г;

*допоміжні речовини:* сахароза, сахарин натрію, смакова добавка журавлина 191121.

**Лікарська форма.** Гранули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білі або майже білі сипучі гранули з приємним запахом.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються в урології. Код АТХ G04B X.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Натрію цитрат метаболізується у бікарбонат, який сприяє регресії дизурії, що спостерігається при циститі, зменшує кислотність сечі, спричиняючи підлужування.

*Фармакокінетика.*

Фармакокінетика натрію цитрату відповідає його природній фармакокінетиці в організмі.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Полегшення симптомів циститу у жінок.

**Протипоказання.**

- Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату.
- Цукровий діабет.
- Захворювання серця.
- Артеріальна гіпертензія.
- Захворювання нирок.
- Перебування на низькосольовій дієті.
- Вагітність, годування груддю.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Слід уникати сумісного застосування препаратів, що містять натрій, хворим, які отримують препарати літію, оскільки натрій переважно абсорбується нирками, що призводить до збільшення екскреції літію і зниження його рівня у плазмі крові.

Не слід одночасно використовувати препарати, що сприяють залуженню сечі, зокрема цитрат натрію, з уротропіном, оскільки він ефективний лише у кислій сечі.

Терапевтичний ефект ряду лікарських засобів може бути зменшений або збільшений при залуженні сечі або зниженні рН шлункового соку, які виникають внаслідок дії цитрату натрію.

### ***Особливості застосування.***

Якщо симптоми зберігаються після двох днів лікування, необхідно звернутися до лікаря. Не перевищувати рекомендовану дозу.

*Допоміжні речовини.* Препарат містить сахарозу. Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Цей лікарський засіб містить 40,8 ммоль (939 мг)/доза натрію. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам, які застосовують натрій-контрольовану дієту.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Протипоказано у період вагітності або годуванню груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не встановлено.

### ***Спосіб застосування та дози.***

#### ***Жінки (дорослі)***

Вміст одного саше розчинити у 1 склянці води.

Приймати внутрішньо по 1 саше 3 рази на добу протягом 48 годин.

Приготовлений розчин необхідно використати одразу.

#### ***Чоловіки та діти***

Не рекомендується.

*Діти.*

Не рекомендується.

### **Передозування.**

Передозування препаратом малоімовірно.

*Симптоми:* у випадку надмірного вживання цитрату натрію можуть виникнути відчуття шлунково-кишкового дискомфорту та діарея. Передозування солями натрію може призвести до гіпернатріємії та гіперосмолярності. Надмірне вживання бікарбонатів може призвести до гіпокаліємії та метаболічного алкалозу, особливо у пацієнтів із порушеною функцією нирок.

*Лікування:* симптоматичне, включаючи відповідну корекцію водно-електролітного балансу.

### **Побічні реакції.**

*З боку імунної системи:* реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання.

*З боку шлунково-кишкового тракту:* біль у животі.

*З боку нирок та сечовидільної системи:* помірне посилення діурезу.

**Термін придатності.** 3 роки.

### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка.**

По 5,6 г гранул у саше. По 6 саше у картонній упаковці.

### **Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

Кусум Хелтхкер Пвт Лтд/

Kusum Healthcare Pvt Ltd.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Плот № М-3, Індор Спешел Ікономік Зоун, Фейз-ІІ, Пітампур, Діст. Дхар, Мадхья Прадеш, Пін 454774, Індія/

Plot No. M-3, Indore Special Economic Zone, Phase-II, Pithampur, Distt. Dhar, Madhya Pradesh, Pin 454774, India