

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ГРИП-ГРАН ДИТЯЧИЙ
(GRIP-GRAN BABY)

Склад:

діючі речовини: 10 г гранул містять: China 30CH 20 мг, Ferrum phosphoricum 50CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Arnica 30CH 20 мг, Arsenicum album 1000CH 20 мг;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули.

Основні фізико-хімічні властивості: гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Властивості зумовлені поєднанням рослинних та мінеральних компонентів, що входять до складу лікарського засобу.

Виявляє жарознижувальну, протизапальну, метаболічну, імуномодулюючу дії.

Компоненти, що входять у комплекс, підібрані з урахуванням особливостей перебігу вірусних та бактеріальних інфекцій у дітей (схильність до гіпертермічних реакцій, судомних реакцій на тлі підвищення температури тіла, схильність до генералізації запальних процесів).

«Грип-гран дитячий» також показаний дорослим при тяжкому перебігу захворювань з вираженими симптомами інтоксикації та гіпертермії.

Клінічні характеристики.

Показання.

- Симптоматична терапія при грипі, гострих респіраторних захворюваннях, інфекційно-запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів;
- профілактика грипу під час епідемії;
- гарячкові стани у дітей при прорізуванні зубів;
- профілактика гіпертермічних судомних реакцій.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Дитячий вік до 1 року.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

При поєднанні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Особливості застосування. У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини – крупки цукрової – пацієнтам, у яких встановлено непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування лікарського засобу можливе, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Немає даних про негативний вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям віком від 3 років

Під час хвороби приймати по 5 гранул під язик 3 рази на добу до стійкого поліпшення стану.

Для профілактики під час епідемії грипу – по 5 гранул 1 раз на день.

Під час пропасниці – по 5 гранул кожні 10–15 хвилин до покращення.

Гранули слід приймати під язик, тримаючи до повного розсмоктування, за 15–20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. При необхідності гранули розчинити у

невеликій кількості води.

Дітям віком від 1 до 3 років гранули розчинити у невеликій кількості води з розрахунку 1 гранула на 1 рік життя.

Як користуватися контейнером з дозуванням

1. Візьміть контейнер ковпачком донизу.
2. Повертайте вправо або вліво, допоки в ковпачок потрапить потрібна кількість гранул.
3. Зніміть ковпачок з гранулами та використовуйте його, щоб насипати гранули під язик.

Діти. «Грип-гран дитячий» можна застосовувати дітям віком від 1 року.

Передозування. Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

Побічні реакції. У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням:
<https://aisf.dec.gov.ua>

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 10 г у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Тургенєвська, 76-78.