

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ОКСОЛІНОВА МАЗЬ

(OXOLINI UNGUENTUM)

Склад:

діюча речовина: оксолін;

1 г мазі містить оксоліну (у перерахунку на безводну речовину) 2,5 мг;

допоміжні речовини: олія мінеральна, парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або світло-жовтого кольору. У процесі зберігання допускається поява рожевого відтінку.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що діють на органи чуття. Протимікробні засоби. Противірусні засоби. Код ATX S01A D.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Оксолін чинить противірусну дію відносно ДНК- і РНК-вірусів: аденовірусу, вірусу грипу, простого герпесу і *Herpes zoster*. Механізм противірусної активності препарату полягає у хімічній взаємодії з гуаніновими залишками нуклеїнових кислот вірусів, унаслідок чого нуклеїнова кислота стає функціонально неактивною.

Фармакокінетика.

При нанесенні мазі на шкіру і слизові оболонки препарат швидко всмоктується, частково проникає у кров і паренхіматозні органи (печінка, нирки, селезінка). Оксолін відносно швидко виводиться з організму з сечею і в органах не накопичується.

Клінічні характеристики.

Показання.

Лікування вірусного риніту, профілактика грипу.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до оксоліну та до інших компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Одночасне інтраназальне застосування з адреноміметичними засобами може спричинити пересушування слизової оболонки носа.

Особливості застосування.

Мазь не призначена для нанесення на слизову оболонку очей. Препарат не можна наносити на уражену шкіру.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Дані про безпеку відсутні, тому не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Лікування вірусного риніту: препарат наносити на слизову оболонку носа 2–3 рази на добу протягом 3–4 днів.

Профілактика грипу: під час підйому та максимального спалаху епідемії (зазвичай протягом 25 днів) або при контакті з хворими на грип препарат наносити на слизову оболонку носа щоденно 2 рази на добу (вранці та ввечері).

Діти. Дані про безпеку та ефективність застосування дітям відсутні.

Передозування.

Про випадки передозування дотепер не повідомлялося.

Симптоми: можливі відчуття печіння на слизовій оболонці носа та ринорея.

Лікування: припинити застосування мазі, залишки препарату змити теплою водою.

Побічні реакції.

У місці нанесення мазі може виникати короткочасне відчуття печіння, ринорея, забарвлення слизової оболонки у синій колір.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 10 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 г у тубі в пачці, по 10 г у контейнерах.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул.
Корольова, б. 4.