

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

КАЛЬЦІУМ ФЛУОРАТУМ СІЛЬ ДОКТОРА ШЮССЛЕРА № 1

(CALCIUM FLUORATUM SALT OF DR. SCHUESSLER № 1)

Склад:

діюча речовина: 1 таблетка містить *Calcium fluoratum D12* 250 мг (містить лактози моногідрат);

допоміжні речовини: крохмаль пшеничний, магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: білого або майже білого кольору таблетки плоскоциліндричної форми зі скошеною кромкою і відтиском (з одного боку «1»).

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний лікарський засіб.

Фармакологічні властивості.

Препарат є однією з 12 потенційованих солей доктора Шюсслера.

Мінеральні солі необхідні організму для підтримання функцій клітин. Відповідно до теорії доктора Шюсслера, регуляторні розлади функцій клітин часто призводять до розвитку захворювань та нездужання. Метод лікування мінеральними солями доктора Шюсслера регулює функціональні здатності клітин організму, гармонізуючи баланс мінеральних солей.

Фтористий кальцій (*Calcium fluoratum*) міститься у зубній емалі, кістках і клітинах поверхневого шару шкіри, окрім того, зустрічається також в еластичних тканинах, таких як зв'язки і суглоби.

Застосовувати відповідно до «гомеопатичного патогенезу» (клінічної характеристики препарату).

Кальцій флуоратум (фтористий кальцій) – мінеральна сіль для підтримки еластичності тканин. Вона підвищує еластичність сполучних тканин, зв'язок та сухожиль, а також сприяє зміцненню кісток і зубів.

Клінічні характеристики.

Показання.

Застосовувати як підтримуюче лікування при варикозному захворюванні вен, забиттях та розтягненнях м'язів і зв'язок.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого допоміжного компонента препарату.

У зв'язку з вмістом пшеничного крохмалю препарат протипоказаний пацієнтам з алергією на пшеницю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Дотепер невідома.

Особливості застосування.

Препарат містить лактозу, що слід враховувати пацієнтам з непереносимістю лактози.

Препарат можна застосовувати пацієнтам, які страждають на целиакію.

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне загострення симптомів захворювання, що не є протипоказанням до застосування, а потребує тимчасового припинення прийому препарату та консультації лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Рекомендовано застосовувати препарат тільки після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози. Необхідно дотримуватися наступних рекомендацій для застосування:

| | | |
|---------------------|---|---|
| Вік пацієнта | Гострі стани (раптова поява симптомів) | Хронічні стани (наявність симптомів протягом тривалого часу) |
|---------------------|---|---|

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Діти віком від 12 років та дорослі | 1 таблетка максимально 6 разів на добу | 1 таблетка 1-3 рази на добу |
| Діти віком від 6 до 11 років | 1 таблетка максимально 4 рази на добу | 1 таблетка 1-2 рази на добу |
| Діти віком від 1 року до 5 років | 1 таблетка максимально 3 рази на добу* | 1 таблетка 1 раз на добу ** |
| Діти віком до 1 року | 1 таблетка максимально 2 рази на добу * | 1 таблетка 1 раз на добу ** |

* Дітям віком до 5 років рекомендується розчиняти таблетку в 1 чайній ложці води.

** Розчинити 1 таблетку в 100 мл води і давати дитині по 15 мл (1 столова ложка) цього розчину

1-3 рази на добу.

Таблетку приймати за 30 хвилин до або після їди, даючи їй повільно розчинитися в роті.

Діти.

Як однокомпонентний гомеопатичний препарат Кальціум флуоратум сіль доктора Шюсслера № 1 у педіатричній практиці можна застосовувати дітям усіх вікових категорій.

Передозування. Передозування не спостерігалось.

Побічні реакції.

У зв'язку з вмістом пшеничного крохмалю при застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості. Якщо пацієнт спостерігає будь-які побічні явища, не описані в даній інструкції, слід проінформувати про це лікаря.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 80 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/

Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.