**ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

# НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9%

**(Sodium Chloride Solution 0,9%)**

***Склад:***

*діюча речовина:* натрію хлорид;

1 мл розчину містить 9 мг натрію хлориду;

*допоміжна речовина:* вода для ін’єкцій.

**Лікарська форма.** Розчин для ін’єкцій.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина

**Фармакотерапевтична група.** Кровозамінники і перфузійні розчини. Розчини електролітів. Код АТХ В05Х А03.

***Фармакологічні властивості.***

*Фармакодинаміка.* 0,9 % розчин натрію хлориду нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті. Лікарський засіб поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку. Виявляє також дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.

*Фармакокінетика.* Швидко виводиться із судинної системи. Лікарський засіб знаходиться у судинному руслі короткий час, після чого переходить до інтерстиціального та внутрішньоклітинного сектора. Через 1 годину в судинах залишається лише приблизно половина введеного розчину. Дуже швидко солі та рідина починають виводитися нирками, підвищуючи діурез.

**Клінічні характеристики.**

***Показання.*** Застосовувати для приготування розчинів лікарських засобів для зовнішнього та

парентерального застосування; місцево — для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.

***Протипоказання.*** Несумісність основного лікарського засобу та розчинника. Лікарський засіб не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.*** Препарат сумісний з більшістю лікарських засобів, тому його можна застосовувати для розчинення різних лікарських засобів, за винятком тих лікарських засобів, які не сумісні з натрію хлоридом як розчинником.

***Особливості застосування.*** Перед розчиненням будь-якого лікарського засобу слід перевірити, чи можливе застосування розчину натрію хлориду для розчинення цього лікарського засобу.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Лікарський засіб можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.*** Застосовувати внутрішньовенно, внутрішньом’язово, ректально або підшкірно (залежно від рекомендованого способу застосування). Для промивання ран, слизових оболонок розчин застосовувати у достатній кількості.

*Діти.* Лікарський засіб можна застосовувати дітям.

***Передозування.***

При правильному застосуванні малоймовірне.

***Побічні реакції.***

Не спостерігаються при правильному застосуванні лікарського засобу.

***Термін придатності.*** 2 роки.

**Умови зберігання**. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25  С у недоступному для дітей місці.

***Несумісність.***

Визначається лікарським засобом, який слід розводити розчином натрію хлориду.

**Упаковка.** По 2 мл, 5 мл або по 10 мл в ампулах полімерних; № 10 у  пачці.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.** Приватне акціонерне товариство «Інфузія».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 23219, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, б. 84А.