

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН З ГЛІЦЕРИНОМ

Склад:

діючі речовини: йод, калію йодид;

1 г розчину містить йоду 10 мг, калію йодиду 20 мг;

допоміжні речовини: вода очищена, гліцерин.

Лікарська форма. Розчин оромукозний.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, сиропоподібна рідина червоно-бурого кольору з запахом йоду.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. «Люголя розчин з гліцерином» чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту у ньому вільного йоду. Лікарський засіб чинить протимікробну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вульгарний протей.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі захворювання печінки та нирок,

виражена гіперфункція щитовидної залози, декомпенсована серцева, ниркова або печінкова недостатність; дослідження або терапія радіоактивним йодом (за 2 тижні перед та після дослідження або терапії).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфекційними засобами.

Особливості застосування.

Лікарський засіб не призначений для прийому внутрішньо. Не слід вдихати та/або проковтувати препарат. Не допускати потрапляння препарату в очі. З обережністю застосовувати при ларингіті через можливість ларингоспазму; при туберкульозі, геморагічних діатезах.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу – це може зашкодити здоров'ю.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Для зовнішнього застосування!

Тампоном, змоченим препаратом, змащувати уражені слизові оболонки глотки та гортані 3–4 рази на день.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

Діти.

Не рекомендується застосовувати дітям віком до 5 років.

Передозування.

Можлива поява йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъозотеча, слиновиділення, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

Лікування. Негайне припинення застосування лікарського засобу та симптоматична терапія.

Побічні реакції.

При тривалому застосуванні можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъозотеча, слинотеча, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у флаконах у пачці з картону або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua