

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

РОМАШКИ КВІТКИ

Склад:

діюча речовина: ромашки квітки (*matricariae flores*);

1 пачка містить ромашки квітки (*matricariae flores*) 40 г або 50 г;

1 фільтр-пакет містить ромашки квітки (*matricariae flores*) 1,5 г.

Лікарська форма. Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: цілі або такі, що частково обсіпалися, кошики напівкулястої або конічної форми, без квітконосів або з їх залишками не довше 3 см.

Порошкоподібна маса, суміш часток блідо-жовтого, жовтого, білого, жовтувато-зеленого кольору.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості.

Ромашки квітки містять олію ефірну, до складу якої входить хамазулен, прохамазулен, інші терпени і сесквітерпени, а також флавоноїди, кумарини, полісахариди, солі мінеральні, каротин, кислоту аскорбінову, ситостерин, холін, кислоти органічні. Цей комплекс біологічно активних речовин чинить спазмолітичну, болезаспокійливу, протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну і седативну дію. Препарати з квіток ромашки знижують алергічні реакції, покращують процеси регенерації, підвищують секреторну діяльність травних залоз, збуджують апетит, усувають спазми кишечника, зменшують бродильні процеси.

Клінічні характеристики.

Показання.

Внутрішньо застосовують при гастритах, запальних захворюваннях печінки та жовчного міхура, ентероколітах, метеоризмі, застудних захворюваннях.

Зовнішньо – при запальних захворюваннях порожнини рота і горла.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що містяться у лікарському засобі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Лікарський засіб застосовують за призначенням лікаря, якщо користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

3 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовують у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{3}$ склянки, дітям віком 12-14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки; 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці, 1-3 роки – по 1 десертній ложці, 6 місяців-1 рік – по $\frac{1}{2}$ -1 чайній ложці. Зовнішньо настій використовують для полоскань 3-4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 склянці, дітям віком 12-14 років – по $\frac{2}{3}$ склянки, 7-12 років – по $\frac{1}{2}$ склянки, 3-7 років по $\frac{1}{4}$ склянки, 1-3 роки – по 2 столові ложки, 6 місяців- 1 рік – по 1 десертній

ложці. Зовнішньо настій використовують для полоскань 3-4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Застосовують дітям віком від 6 місяців за призначенням лікаря.

Передозування.

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри).

При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 40 г або 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

По 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 або 25 фільтр-пакетів у пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.