

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ПРОСТАТОН

(PROSTATON)

Склад:

діючі речовини: 10 г гранул містять: Clematis 50CH 20 мг, Argentum nitricum 30CH 20 мг, Thuja 30CH 20 мг, Selenium 50CH 20 мг, Pareira brava 30CH 20 мг;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули.

Основні фізико-хімічні властивості: гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Фармакологічні властивості лікарського засобу зумовлені поєднанням мінеральних та рослинних компонентів, що входять до його складу. Виявляє протизапальну, діуретичну дію, регулює тонус та перистальтику нижніх відділів сечовивідного тракту, зменшує проникність судин.

Клінічні характеристики.

Показання.

Запальні захворювання передміхурової залози; простатит; дизуричні розлади у чоловіків (у тому числі при аденомі простати, циститі, простатиті).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування. При аденомі простати можна призначати як допоміжний засіб до основної терапії гомеопатичним препаратом «Аденома-гран».

При поєднанні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Особливості застосування.

У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини — крупки цукрової — проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Чоловікам призначати по 5 гранул 1 раз на добу курсами по 3 місяці з перервою у 7 днів.

Гранули приймати під язик, тримаючи до повного розсмоктування, за 15–20 хвилин до або через 1 годину після їди.

Як користуватись контейнером з дозуванням



1. Візьміть контейнер
ковпачком донизу.



Діти. Не застосовувати дітям.

Передозування.

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

Побічні реакції.

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та обов'язково звернутися до лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не

вище 25 °С.

Упаковка. По 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Місцезнаходження заявника та адреса місця провадження його діяльності.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Тургенєвська, 76-78.