

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ЕНТЕРОСГЕЛЬ З СОЛОДКИМ СМАКОМ**  
**(ENTEROSGELUM DULCIS)**

**Склад:**

*діюча речовина:* 100 г містить гідрогелю метилкремнієвої кислоти – 69,9 г;

*допоміжні речовини:* сахарин натрію дигідрат, натрію цикламат, вода очищена.

**Лікарська форма.** Паста для перорального застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* однорідна пастоподібна маса білого кольору, без запаху.

**Фармакотерапевтична група.**

Ентеросорбенти. Код АТХ А07В С.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Ентеросгель – інертна кремнієорганічна сполука. При застосуванні проявляє сорбційну дію. Лікарський засіб ефективно адсорбує середньомолекулярні токсичні речовини екзо- та ендogenous походження, продукти незавершеного метаболізму, інкорпоровані радіонукліди та природним шляхом виводить їх з організму. Ентеросгель усуває прояви токсикозу, покращує функцію кишечника, детоксикуючу функцію печінки, нирок, нормалізує показники крові та сечі.

*Фармакокінетика.*

Покриваючи слизову оболонку шлунка та кишечника, Ентеросгель захищає її від ерозивних процесів, сприяє підвищенню локального імунітету. Ентеросгель не всмоктується з кишечника і не зазнає метаболічних або хімічних перетворень.

## **Клінічні характеристики.**

### ***Показання.***

Детоксикація організму при хронічній нирковій недостатності, спричиненій пієлонефритом, полікістозом нирок, нефролітіазом; при токсичному гепатиті, вірусному гепатиті А і В, холециститі, цирозі печінки, холестази різної етіології, гастриті зі зниженою кислотністю, ентероколіті, коліті, діареї; при отруєнні алкоголем і наркотичними засобами; при алергічних реакціях, шкірних захворюваннях (діатези, нейродерміти); при опіковій хворобі; гнійно-септичних процесах; токсикозах першої половини вагітності; у комплексній терапії дисбіозу кишечника.

### ***Протипоказання.***

Гостра кишкова непрохідність. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Індивідуальна непереносимість компонентів препарату.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Препарат може зменшувати дію інших лікарських засобів, які застосовуються разом з ним. Не рекомендується одночасний прийом з препаратами, що належать до класу секвестрантів жовчних кислот, наприклад з холестираміном, оскільки збільшується імовірність розвитку закрепів.

Лікарський засіб не слід застосовувати разом з препаратами срібла.

### ***Особливості застосування.***

Приймати препарат слід згідно з цією інструкцією. За умови дотримання способу застосування (Ентеросгель і інші лікарські засоби приймати з інтервалом 1,5-2 години), препарат можна застосовувати у комплексній терапії з іншими лікарськими і профілактичними засобами, у тому числі з пребіотиками та пробіотиками (біфідум-, лактобактерії), фітопрепаратами, адаптогенами, імуномодуляторами.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю. Слід обмежити застосування вагітним, які мають схильність до запорів.

### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Приймати всередину 2-3 рази на добу за 1,5-2 години до або через 2 години після їди чи застосування інших медикаментів, запиваючи достатньою кількістю води.

Для дорослих та дітей віком від 14 років разова доза препарату становить 15 г (столова ложка), добова – 45 г.

Для дітей від народження до 3 років разова доза препарату становить 5 г (чайна ложка), добова – 10 г; віком від 3 до 5 років – разова доза – 5 г, добова – 15 г; від 5 до 14 років – разова доза – 10 г (десертна ложка), добова – 30 г.

Курс лікування – від 7 до 14 діб. При тяжких формах захворювань протягом перших трьох діб застосовувати подвійну разову дозу, а при хронічному перебігу хвороби (хронічна ниркова недостатність, цироз печінки) можливе більш тривале застосування препарату.

### ***Діти.***

Препарат можна застосовувати дітям від народження. Дітям віком до 2 років перед застосуванням разову дозу препарату можна змішати з невеликою кількістю води.

### ***Передозування.***

Випадків передозування не описано. При передозуванні можливе посилення побічних ефектів.

### ***Побічні реакції.***

При прийомі препарату можливі диспепсичні явища. У перші дні прийому препарату можливий розвиток запору. Для його запобігання людям, схильним до запору, у перші два дні прийому препарату рекомендується очисна клізма на ніч або застосування проносних засобів (лактолоза, пікосульфат натрію). Можливі реакції гіперчутливості. Можливі прояви індивідуальної непереносимості компонентів препарату.

### ***Термін придатності.* 2 роки.**

### ***Умови зберігання.***

Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не більше 25 °С, не допускати заморожування. Після відкриття упаковки зберігати у тих же самих умовах у щільно закритій тарі.

**Упаковка.**

По 135 г, 270 г, 405 г у контейнері пластмасовому; по 1 контейнеру в коробці з картону; по 15 г у пакеті; по 10 або 20 пакетів у коробці з картону; по 90 г або 225 г у тубі; по 1 тубі в коробці з картону.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, м. Київ, вул. Радищева, 3.