

# **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

## **ЕТАНОЛ 96 (ETHANOL 96)**

### **Склад:**

діюча речовина: етанол;  
не менше 95,1 % і не більше 96,9 % етанолу за об'ємом.

### **Лікарська форма.**

Розчин для зовнішнього застосування 96 %.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина.  
Гігроскопічна.

### **Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби.

**Код ATX D08A X08.**

### **Фармакологічні властивості.**

#### *Фармакодинаміка.*

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.

#### *Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

Дезінфекція шкіри.

#### **Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість. Гострі запальні процеси шкіри. Дитячий вік до 14 років.

#### **Особливі заходи безпеки.**

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі!

#### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Зовнішньо – наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

*Діти.*

Не застосовувати дітям віком до 14 років.

***Передозування.***

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

***Побічні реакції.***

При місцевому застосуванні – подразнення шкіри або слизових оболонок.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

***Термін придатності.***

5 років.

***Умови зберігання.***

При температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці. Не допускати контактів з відкритим вогнем.

***Упаковка.***

По 100 мл у флаконах скляних, по 100 мл у флаконах полімерних.

По 1 л, 5 л, 10 л, 20 л у каністрах полімерних (для постачання у медичні заклади).

***Категорія відпуску.***

За рецептром.

***Виробник.***

ПП «Кілафф».

***Місцезнаходження.***

Україна, 40035, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, 6.