

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

**СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %**

**(ALCOHOL ETHYL 96 %)**

### **Склад:**

*діюча речовина:* етанол;

не менше 95,1 % об/об (92,6 % м/м) і не більше 96,9 % об/об (95,2 % м/м) етанолу, а також воду.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

### **Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.

### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.

*Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

### **Клінічні характеристики.**

### ***Показання.***

Дезінфекція шкіри рук.

### ***Протипоказання.***

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри. Дитячий вік до 14 років.

### ***Особливі заходи безпеки.***

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

### ***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності або годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Зовнішньо – наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

*Діти.*

Не застосовувати дітям віком до 14 років.

**Передозування.**

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

**Побічні реакції.**

При місцевому застосуванні – подразнення шкіри або слизових оболонок.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ, необхідно звернутися до лікаря.*

**Термін придатності.** 5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці. Не допускати контактів з відкритим вогнем.

**Упаковка.** По 100 мл у флаконах скляних.

По 1 л, 5 л, 10 л у каністрах полімерних (для використання у медичних закладах).

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.**

АТ «Лубнифарм».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

