

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

М'ЯТНІ ТАБЛЕТКИ

Склад:

діюча речовина: 1 таблетка містить олії м'яти перцевої в перерахуванні на 50 % ментол – 2,5 мг;

допоміжні речовини: цукор кондитерський, тальк, кальцію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого кольору, з рискою і фаскою, плоскоциліндричної форми.

Фармакотерапевтична група. Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Код АТХ А04А D.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

М'ятні таблетки, стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлексним шляхом послаблюють відчуття нудоти і попереджають блювання, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Симптоматичне лікування нудоти, блювання, спазмів гладких м'язів шлунково-кишкового тракту, відчуття гіркоти в роті.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Цукровий діабет, круп, спазмофілія, бронхіальна астма. Дитячий вік до 3 років.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Особливості застосування.

Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування препарату, оскільки може збільшитися печія.

Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності можливе тільки тоді, коли очікувана користь від лікування матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини. При необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат загалом не впливає на здатність керувати автомобілем і займатися іншими видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій. У разі появи ознак побічної дії препарату (див. «Побічні реакції») необхідно уникати керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Призначати по 1-2 таблетки під язик. Максимальна доза препарату для дорослих і дітей віком від 12 років – 8-10 таблеток на добу. Для дітей віком від 3 до 12 років – 3-5 таблеток на добу.

Курс лікування залежить від досягнутого ефекту лікування.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 3 років.

Передозування.

Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця.

Побічні реакції.

Біль у ділянці серця; алергічні реакції, у тому числі гіперемія, висипи, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, дерматит; в окремих випадках – запаморочення. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 таблеток у блістерах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

Заявник.

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Місцезнаходження заявника.

Україна, 02100, місто Київ, б, Верховної Ради, будинок 7, поверх 3, приміщення 18.