

## **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

### **СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % (ETHYL ALCOHOL 96 %)**

#### **Склад:**

*діюча речовина:* етанол;

не менше 95,1 % об/об (92,6 % м/м) і не більше 96,9 % об/об (95,2 % м/м) етанолу, а також вода.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби.

**Код АТХ D08A X08.**

#### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфекційну, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.

*Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Для дезінфекції шкіри рук.

### ***Протипоказання.***

Підвищена індивідуальна чутливість.

Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.

Дитячий вік до 14 років.

### ***Особливі заходи безпеки.***

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

### ***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Зовнішньо — наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

*Діти.*

Не застосовують дітям віком до 14 років.

**Передозування.**

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

**Побічні реакції.**

При місцевому застосуванні — подразнення шкіри або слизових оболонок.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 5 років.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці. Берегти від вогню.

**Упаковка.** По 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками; у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками з контролем першого розкриття; у флаконах полімерних, укупорених кришками з контролем першого розкриття. По 100 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками або алюмінієвими кришками; у флаконах полімерних, укупорених кришками з контролем першого розкриття. По 200 мл у банках скляних або флаконах полімерних, укупорених кришками з контролем першого розкриття. По 0,5 л або по 1 л, або по 2 л, або по 5 л, або по 10 л, або по 20 л у каністрах, укупорених кришками (для використання у медичних закладах).

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.** Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.