ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

РИЦИНОВА ОЛІЯ

Склад:

діюча речовина: рицинова олія;

1 флакон містить 30 мл, 50 мл, 100 мл рицинової олії.

Лікарська форма. Олія.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина прозора, густа і в’язка, безбарвна або злегка жовтувата зі слабким запахом і своєрідним, неприємним смаком. На повітрі в тонкому шарі повільно густішає, але не утворює щільної або твердої плівки.

Фармакотерапевтична група.

Проносний засіб. Код АТХ А06А В05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

При застосуванні внутрішньо гідролізується ліпазою у тонкому кишечнику з утворенням рицинолевої кислоти, яка спричиняє подразнення рецепторів кишечнику та рефлекторно посилює його перистальтику. Проносний ефект настає звичайно через 5-6 годин. Препарат також спричиняє рефлекторне скорочення міометрія.

Фармакокінетика.

Фармакокінетика не визначалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Запори.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до лікарського засобу; підвищена чутливість до рослин родини молочайних (*Euphorbiaceae*); отруєння жиророзчинними речовинами (фосфором, бензолом, фенолом); виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, виразковий коліт; отруєння жиророзчинними протигельмінтними засобами, екстрактом папороті чоловічої; гострі запальні процеси у черевній порожнині (апендицит, перитоніт); маткові кровотечі; кахексія; літній вік; недіагностований біль у ділянці живота; обструкція жовчовивідних проток; тяжка дегідратація.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не рекомендовано застосовувати Рицинову олію одночасно з екстрактом папороті чоловічої.

Особливості застосування.

Рицинова олія є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтвердженим тривалим застосуванням.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити Вашому здоров'ю.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування лікарського засобу протипоказане у період вагітності.

У період годування груддю препарат застосовують лише в тому разі, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Даних немає.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати внутрішньо.

Рекомендована доза для дорослих та дітей від 12 років – 15-30 мл на прийом.

Якщо препарат застосовують для очищення кишечнику перед діагностичними процедурами, то доцільно вжити його за 6 годин до проведення процедури.

Якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються будь-які побічні реакції, пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем.

Діти.

Препарат застосовують дітям віком від 12 років.

Передозування.

Симптоми: нудота, блювання, біль у животі, діарея.

Лікування: симптоматична терапія.

Побічні реакції.

Нудота, блювання, пронос, біль у животі, порушення водно-електролітного балансу. Після спорожнення кишечнику можливий запор. При тривалому застосуванні – порушення травлення, ентероколіт, розвиток звикання, атонія кишечнику.

Можливі алергічні реакції.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 мл, 50 мл, 100 мл у флаконах скляних або полімерних.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.