

**ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування лікарського засобу**

**ЕТОНІЙ**

**Склад:**

діюча речовина: 1 г мазі містить етонію 10 мг;

допоміжні речовини: ланолін, парафін білий м'який, вода очищена.

**Лікарська форма.** Мазь.

**Основні фізико-хімічні властивості:** густа однорідна маса світло-жовтого кольору.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Сполуки четвертинного амонію. Код ATX D08A J.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Етоній чинить бактеріостатичну та бактерицидну дію, зумовлену порушенням процесів синтезу клітинної оболонки стрептококів, стафілококів. Чинить також легку місцевоанестезуючу і ранозагоювальну дію. Сприяє регенерації пошкоджених тканин. Чинить детоксикуючу дію щодо стафілококового токсину.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Трофічні виразки шкіри, тріщини сосків, прямої кишki та промежини, вагініт, опіки (термічні, хімічні, променеві та слизових оболонок), рентгенівські дерматити.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату (алергічний дерматит, екзема); алергічні реакції на компоненти препарату, гнійні і гангренозні форми пульпітів.

## ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При одночасному застосуванні з антибіотиками групи тетрациклінів, гентаміцином сульфатом, левоміцетином посилюється дія антибіотиків.

## ***Особливості застосування.***

Не допускати потрапляння препарату в очі.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Немає жодних підстав вважати, що застосування препарату у період вагітності є ризикованим. Протягом вагітності препарат слід застосовувати за призначенням лікаря.

При застосуванні для лікування тріщин соків у період годування груддю препарат слід змити перед годуванням.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

## ***Спосіб застосування та дози.***

Застосовують зовнішньо.

Для лікування трофічних виразок і опіків препарат наносять безпосередньо на ушкоджену поверхню і накладають стерильну пов'язку або мазь накладають на пов'язку, а потім її - на рану.

Препарат наносять на уражені ділянки шкіри дорослим 1-2 рази на добу. Тривалість курсу лікування - від 3 днів до 1 місяця.

*Діти.*

Досвід застосування Етонію дітям відсутній.

## ***Передозування.***

Інформація про передозування відсутня.

## ***Побічні реакції***

Можливі гіперемія шкіри, свербіж, алергічні реакції.

**Термін придатності.**

3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 15 г у банці або тубі; по 1 банці або тубі в пачці з картону.

По 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

ПАТ «Лубнифарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.