

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**календули мазь**

**Склад:**

діюча речовина: 1 г мазі містить календули настойки (*tinctura Calendulae*) (1:10) - 100 мг;  
допоміжні речовини: парафін білий м'який, вода очищена, емульгатор Т-2.

**Лікарська форма.** Мазь.

**Основні фізико-хімічні властивості:** мазь жовтуватого кольору. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

**Фармакотерапевтична група.**

Препарати, що сприяють загоюванню ран. Код ATX D03A X.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Препарат чинить протизапальну, репаративну та антисептичну дію. Ці ефекти зумовлені багатим вмістом речовин (каротиноїди, флавоноїди, сапоніни, дубильні речовини, тритерпенові глікозиди, органічні кислоти, аскорбінова кислота).

**Фармакокінетика.** Не вивчалась.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Опіки, порізи, тріщини, рани.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

## ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Не встановлена.

## ***Особливості застосування.***

Запобігати потраплянню мазі в очі. У разі випадкового потрапляння мазі в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Не рекомендується застосовувати «Календули мазь» у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

## ***Спосіб застосування та дози.***

Мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки (можна застосовувати під оклюзійну пов'язку). Тривалість застосування залежить від характеру та перебігу і тяжкості патологічного процесу та досягнутого ефекту.

*Діти.*

Безпека та ефективність застосування мазі дітям віком до 12 років не встановлені, тому застосовувати препарат цієї категорії пацієнтів можна тільки після ретельної оцінки співвідношення ризик/користь (за призначенням лікаря).

## ***Передозування.***

Не виявлено. Можливе посилення проявів побічних реакцій.

## ***Побічні реакції.***

При індивідуальній підвищенні чутливості можуть спостерігатися алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 г у тубах у пачці або без пачки.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.**

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.**

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, [www.ternopharm.com.ua](http://www.ternopharm.com.ua)